

Cinfastrozoletm 1 mg film-coated tablets

anastrozole

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

What is in this leaflet

1. What Cinfastrozoletm is and what it is used for
2. What you need to know before you take Cinfastrozoletm
3. How to take Cinfastrozoletm
4. Possible side effects
5. How to store Cinfastrozoletm
6. Contents of the pack and other information

1. What Cinfastrozoletm is and what it is used for

Cinfastrozoletm contains a substance called anastrozole. This belongs to a group of medicines called 'aromatase inhibitors'. Cinfastrozoletm is used to treat breast cancer in women who have gone through the menopause.

Cinfastrozoletm works by cutting down the amount of the hormone called estrogen that your body makes. It does this by blocking a natural substance (an enzyme) in your body called 'aromatase'.

2. What you need to know before you take Cinfastrozoletm

Do not take Cinfastrozoletm

- if you are allergic to anastrozole or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6).
- if you are pregnant or breast-feeding (see the section called 'Pregnancy and breast-feeding').

Do not take Cinfastrozoletm if any of the above apply to you. If you are not sure, talk to your doctor or pharmacist before taking Cinfastrozoletm.

Warnings and precautions

Talk to your doctor or pharmacist before taking Cinfastrozoletm

- if you still have menstrual periods and have not yet gone through the menopause.
- if you are taking a medicine that contains tamoxifen or medicines that contain estrogen (see the section called 'Other medicines and Cinfastrozoletm').
- if you have ever had a condition that affects the strength of your bones (osteoporosis).
- if you have problems with your liver or kidneys.

If you are not sure if any of the above applies to you, talk to your doctor or pharmacist before taking Cinfastrozoletm.

If you go into the hospital, let the medical staff know you are taking Cinfastrozoletm.

Other medicines and Cinfastrozoletm

Tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines. This includes medicines that you buy without a prescription and herbal medicines. This is because Cinfastrozoletm can affect the way some medicines work and some medicines can have an effect on Cinfastrozoletm.

Do not take Cinfastrozoletm if you are already taking any of the following medicines:

- Certain medicines used to treat breast cancer (selective estrogen receptor modulators), e.g. medicines that contain tamoxifen. This is because these medicines may stop Cinfastrozoletm from working properly.
- Medicines that contain estrogen, such as hormone replacement therapy (HRT). If this applies to you, ask your doctor or pharmacist for advice.

Tell your doctor or pharmacist if you are taking the following:

- A medicine known as an 'LHRH analogue'. This includes gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin and triptorelin. These medicines are used to treat breast cancer, certain female health (gynaecological) conditions, and infertility.

Pregnancy and breast-feeding

Do not take Cinfastrozoletm if you are pregnant or breast-feeding. Stop Cinfastrozoletm if you become pregnant and talk to your doctor.

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

Driving and using machines

Cinfastrozoletm is not likely to affect your ability to drive or use any tools or machines. However, some people may occasionally feel weak or sleepy while taking Cinfastrozoletm. If this happens to you, ask your doctor or pharmacist for advice.

Cinfastrozoletm contains lactose

Cinfastrozoletm contains lactose which is a type of sugar. If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicine.

Cinfastrozoletm contains sodium

This medicine contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per tablet, that is to say essentially 'sodium free'.

3. How to take Cinfastrozoletm

Always take Cinfastrozoletm exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

- The recommended dose is one tablet once a day.
- Try to take your tablet at the same time each day.
- Swallow the tablet whole with a drink of water.
- It does not matter if you take Cinfastrozoletm before, with or after food.

Keep taking Cinfastrozoletm for as long as your doctor or pharmacist tells you to. It is a long-term treatment and you may need to take it for several years. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Use in children and adolescents

Cinfastrozoletm should not be given to children and adolescents.

If you take more Cinfastrozoletm than you should

If you take more Cinfastrozoletm than you should, talk to a doctor straight away.

If you forget to take Cinfastrozoletm

If you forget to take a dose, just take your next dose as normal.

Do not take a double dose (two doses at the same time) to make up for a forgotten dose.

If you stop taking Cinfastrozoletm

Do not stop taking your tablets unless your doctor tells you to.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Stop taking Cinfastrozoletm and seek urgent medical treatment, if you experience any of the following serious but very rare side effects:

- An extremely severe skin reaction with ulcers or blisters on the skin. This is known as 'Stevens-Johnson syndrome'.
- Allergic (hypersensitivity) reactions with swelling of the throat that may cause difficulty in swallowing or breathing. This is known as 'angioedema'.

Very common side effects (affect more than 1 in 10 people)

- Headache.
- Hot flushes.
- Feeling sick (nausea).
- Skin rash.
- Pain or stiffness in your joints.
- Inflammation of the joints (arthritis).
- Feeling weak.
- Bone loss (osteoporosis).
- Depression.

Common side effects (affect 1 to 10 people in 100)

- Loss of appetite.
- Raised or high levels of fatty substance known as cholesterol in your blood. This would be seen in a blood test.
- Feeling sleepy.
- Carpal tunnel syndrome (tingling, pain, coldness, weakness in parts of the hand).
- Tickling, tingling or numbness of skin, loss/lack of taste.
- Diarrhoea.
- Being sick (vomiting).
- Changes in blood tests that show how well your liver is working.
- Thinning of your hair (hair loss).
- Allergic (hypersensitivity) reactions including face, lips, or tongue.
- Bone pain.
- Bone pain.
- Vaginal dryness.
- Bleeding from the vagina (usually in the first few weeks of treatment – if the bleeding continues, talk to your doctor).
- Muscle pain.

Uncommon side effects (affect 1 to 10 people in 1,000)

- Changes in special blood tests that show how your liver is working (gamma-GT and bilirubin).
- Inflammation of the liver (hepatitis).
- Hives or nettle rash.
- Trigger finger (a condition in which your finger or thumb catches in a bent position).
- Increased amounts of calcium in your blood. If you experience nausea, vomiting and thirst, you should tell your doctor or pharmacist as you may need to have blood tests.

Rare side effects (affect 1 to 10 people in 10,000)

- Rare inflammation of your skin that may include red patches or blisters.
- Skin rash caused by hypersensitivity (this can be from allergic or anaphylactoid reaction).
- Inflammation of the small blood vessels causing red or purple colouring of the skin. Very rarely symptoms of joint, stomach, and kidney pain may occur; this is known as 'Henoch- Schönlein purpura'.

Effects on your bones

Cinfastrozoletm lowers the amount of the hormone called estrogen that is in your body. This may lower the mineral content of your bones. Your bones may be less strong and may be more likely to fracture. Your doctor will manage these risks according to treatment guidelines for managing bone health in women who have gone through the menopause. You should talk to your doctor about the risks and treatment options.

If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store Cinfastrozoletm

Do not store above 30°C.

Keep this medicine out of the sight and reach of children. Keep your tablets in a safe place where children cannot see or reach them. Your tablets could harm them.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton and blister strip. The expiry date refers to the last day of that month.

Keep your tablets in the container they came in.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

6. Contents of the pack and other information

What Cinfastrozoletm contains

The active substance is anastrozole. Each film-coated tablet contains 1 mg of anastrozole.

The other ingredients are:

- Tablet core: lactose monohydrate, anhydrous lactose, sodium carboxymethyl starch from potato, microcrystalline cellulose (E460), anhydrous colloidal silica and magnesium stearate.
- Tablet coating: Hypromellose (E464), titanium dioxide (E171) and Macrogol.

What Cinfastrozoletm looks like and contents of the pack

Cinfastrozoletm is supplied as white, round, biconvex film coated tablets engraved code 1 in one side.

Cinfastrozoletm is supplied in packages containing 28 tablets (7's blister x 4).

Marketing Authorisation Holder and Batch Releaser

Laboratorios Cinfa, S.A.
Olaz-Chipi, 10. P.I. Areta
31620 Huarte (Navarra)
SPAIN

Bulk manufacturing site

Laboratorios Cinfa, S.A.
Avda. Roncesvalles s/n,
31699 Olloki (Navarra)
SPAIN

This leaflet was last revised in February 2021.

This is a Medicament

- Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers
Union of Arab Pharmacists

النشرة الداخلية: معلومات للمريض

سينفاستروزول ١ ملجم أقراص مغلفة

أناستروزول

يرجى قراءة هذه النشرة الدوائية بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات تهمك.

- احتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى فاسأل الطبيب أو الصيدلي.
- وُصف هذا الدواء لك وحدك فلا تعطه للآخرين. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بهم، حتى وإن كانت أعراضهم المرضية مشابهة لما تشعر به.
- إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية فاستشر الطبيب أو الصيدلي. ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. انظر القسم ٤.

محتويات هذه النشرة:

- ما هو سينفاستروزول، وما هي دواعي استعماله.
- ما يجب معرفته قبل تناول سينفاستروزول.
- الجرعة وطريقة استخدام سينفاستروزول.
- الآثار الجانبية المحتملة.
- كيفية تخزين سينفاستروزول.
- محتويات العبوة ومعلومات أخرى.

١- ما هو سينفاستروزول، وما هي دواعي استعماله <p>يحتوي سينفاستروزول على مادة فعالة تدعى أناستروزول. وينتمي إلى مجموعة من الأدوية تعرف بمثبطات الأروماتيز. يُستخدم سينفاستروزول لعلاج سرطان الثدي لدى النساء اللاتي تجاوزن سن انقطاع الطمث.</p> <p>يعمل سينفاستروزول من خلال خفض مقدار هرمون الإستروجين الذي يفرزه الجسم. وذلك من خلال تثبيط إفراز مادة طبيعية (الزيم) داخل الجسم تدعى "أروماتيز".</p>
٢- ما يجب معرفته قبل تناول سينفاستروزول <p>لا تتناولي سينفاستروزول:</p> <ul style="list-style-type: none">إذا كان لديك حساسية للأناستروزول أو أي من مكونات الدواء الأخرى (المدرجة في قسم ٦). إذا كنت حاملاً أو في فترة الإرضاع (انظري القسم بعنوان "الحمل و الإرضاع"). لا تتناولي سينفاستروزول إذا انطبقت عليك أيّ من هذه الحالات، في حال عدم التأكد فاستشري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول سينفاستروزول.

الاحتياطات والتحذيرات

تحدثي مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول سينفاستروزول:

- إذا كنتِ لا تزالين في مرحلة نزول الدورة الشهرية ولم تصلي إلى سن انقطاع الطمث.
- إذا كنتِ تتناولين عقراً يحتوي على تاموكسيفن أو أي عقاقير أخرى تحتوي على هرمون الإستروجين (انظري قسم "التفاعلات مع الأدوية الأخرى").
- إذا أصبت سابقاً بمرض يؤثر في قوة عظامك (هشاشة العظام).
- إذا كنتِ تعانين مشكلات في الكبد أو الكلى.

إذا لم تكوني متأكدة من انطباق هذه الحالات عليك فتحدثي مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول سينفاستروزول.

إذا دخلتِ المستشفى فأخبري الفريق الطبي أنكِ تتناولين سينفاستروزول.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى

أخبري الطبيب أو الصيدلي إذا كنتِ تتناولين أو تناولتِ مؤخراً أي أدوية أخرى. ويشمل ذلك الأدوية المتاحة دون وصفة طبية والأدوية المكونة من أعشاب. نظراً لإمكانية تأثير سينفاستروزول في آلية عمل بعض الأدوية، كذلك إمكانية تأثير أدوية أخرى في مفعول سينفاستروزول.

لا تتناولي سينفاستروزول إذا كنتِ تتناولين بالفعل أيأ من الأدوية التالية:

- بعض الأدوية التي تستخدم لعلاج سرطان الثدي (مُعدلات مستقبلات هرمون الإستروجين الانتقائية)، مثل الأدوية التي تحتوي على تاموكسيفن. لأن هذه الأدوية قد تحول دون عمل سينفاستروزول بشكل صحيح.
- الأدوية التي تحتوي على إستروجين كما في العلاج بالهرمونات البديلة (HRT)، إذا كنتِ ترضعين لمثل هذا العلاج فاستشري طبيبك أو الصيدلي.

أخبري طبيبك أو الصيدلي إذا كنتِ تتناولين الأدوية التالية:

- دواء يعرف باسم نظير الهرمون المطلق للهرمون الملوتن (LHRH)، ويشمل جوناذوريلين، بسيريلين، جوسريلين، ليوبروريلين وتريبتوريلين. تُستخدم هذه الادوية لعلاج سرطان الثدي وبعض الحالات المرضية لدى الإناث (أمراض النساء والتوليد)، والعقم.

الحمل والإرضاع

لا تتناولي سينفاستروزول إذا كنتِ حاملاً أو خلال فترة الإرضاع. توقفي عن تناول سينفاستروزول إذا أصبحتِ حاملاً وتحدثي مع طبيبك، استشري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

القيادة وتشغيل الآلات

من غير المحتمل أن يؤثر سينفاستروزول في قدرتك علي القيادة أو استعمال أي من الآلات أو الأدوات. بالرغم من ذلك، أحياناً قد يشعر البعض بالوهن أو النعاس أثناء تناول سينفاستروزول. إذا كنتِ تشعرين بهذه الأعراض فاستشري طبيبك أو الصيدلي.

يحتوي سينفاستروزول على اللاكتوز <p>يحتوي سينفاستروزول على اللاكتوز وهو أحد أنواع السكر. إذا أخركك طبيبك أنك تعانين حساسية لبعض أنواع السكر فاستشري طبيبك قبل تناول هذا الدواء.</p>
يحتوي سينفاستروزول على الصوديوم <p>يحتوي هذا الدواء على أقل من ١ ملي مول (٢٣ ملجم) من الصوديوم لكل قرص؛ أي أنه يكاد يكون «خالياً من الصوديوم».</p>

٣- الجرعة وطريقة استخدام سينفاستروزول <p>تناولي هذا الدواء دائماً حسب وصف الطبيب أو الصيدلي. استشري طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكوني متأكدة.</p> <ul style="list-style-type: none">الجرعة الموصى بها هي قرص واحد يومياً. حاولي تناول جرعتك اليومية في نفس الوقت من كل يوم. ابتلعي القرص بالكامل مع كوب من الماء. لا يعم تناول سينفاستروزول قبل أو أثناء أو بعد تناول الطعام.

تناولي سينفاستروزول طوال المدة التي يوصي بها طبيبك أو الصيدلي. فهو علاج طويل الأمد قد تحتاجين إلى تناوله لسنوات عديدة. استشري طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكوني متأكدة.

الأطفال والمراهقون

لا يجب إعطاء سينفاستروزول للأطفال والمراهقين.

تناول جرعة زائدة من سينفاستروزول <p>إذا تناولتِ جرعة زائدة من سينفاستروزول فتحدثي مع الطبيب على الفور.</p>

إذا نسيتِ تناول سينفاستروزول <p>إذا نسيتِ تناول إحدى الجرعات فتناولي الجرعة التالية في موعدھا الطبيعي.</p> <p>لا تتناولي جرعة مضاعفة (جرعتين في نفس الوقت) لتعويض الجرعة المنسية.</p>
--

إذا توقفتِ عن تناول سينفاستروزول <p>لا توقفي عن تناول الأقراص حتى يخبرك الطبيب بذلك.</p> <p>إذا كان لديك أي أسئلة أخرى عن طريقة استخدام هذا الدواء فاسألي طبيبك أو الصيدلي.</p>
--

٤- الآثار الجانبية المحتملة <p>مثل كل الأدوية، قد يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، ولكنها لا تظهر بالضرورة على كل من يتناولوه.</p> <p>توقفي عن تناول سينفاستروزول واطلبي علاجاً طبياً على الفور في حالة ظهور أي من الأعراض الجانبية الخطيرة (ولكنها نادرة الحدوث جداً) التالية:</p> <ul style="list-style-type: none">تفاعل جلدي شديد مع ظهور قرح أو بثرات على البشرة. تُعرف هذه الحالة بمتلازمة ستيفنز جونسون. تفاعلات الحساسية (فرط الحساسية) مع تورم الحلق الذي قد ينتج عنه صعوبة في البلع أو التنفس. تُعرف هذه الحالة باسم الوذمة الوعائية.
--

آثار جانبية شائعة جداً (تؤثر في أكثر من شخص واحد من كل ١٠ أشخاص)

- الصداع.
- هبات ساخنة.
- الشعور بالإعياء (الفتيان)
- الطفح الجلدي.
- آلام في المفاصل أو تيبسها.
- التهاب المفاصل.
- الشعور بالوهن.
- هشاشة العظام.
- الإكتئاب

آثار جانبية شائعة (تؤثر في شخص إلى ١٠ أشخاص من كل ١٠٠ شخص) <ul style="list-style-type: none">فقدان الشهية ارتفاع مستويات المادة الدهنية التي تعرف باسم الكوليسترول في الدم. يظهر ذلك في اختثار الدم. الشعور بالتعباس. متلازمة النفق الرسغي (شعور بالوخز، والألم والبرودة والضعف في أجزاء من اليد). شعور بالدغغة أو الوخز الخفيف أو التخدير وفقدان حاسة التذوق. الإسهال. الشعور بالإعياء (القيء). تغير النسب المتعلقة بوظائف الكبد في فحوصات الدم. تساقط الشعر. تفاعلات الحساسية الحادة مثل تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان. آلام العظام. جفاف المهبل. الزيف من المهبل (عادةً يحدث ذلك خلال الأسابيع الأولى من العلاج - في حال استمر الزيف تحدثي مع طبيبك).
ألم في العضلات.

آثار جانبية غير شائعة (تؤثر في شخص إلى ١٠ أشخاص من كل ١,٠٠٠ شخص) <ul style="list-style-type: none">تغير النسب المتعلقة بوظائف الكبد في بعض فحوصات الدم (إنزيم جاما-جي تي وبيليروبين). التهاب الكبد. الشرى أو طفح القراص. الأصبع الزنادية (هي حالة يكون فيها أصبع الإبهام أو أي أصبع آخر من أصابع اليد في الوضع المنحني مثل وضع الأصبع على زناد البندقية). زيادة مستويات الكالسيوم في الدم. في حال إصابتك بالغثيان والقيء والشعور بالعطش، يجب عليك إخبار طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة قد تحتاجين إلى إجراء بعض فحوصات الدم.
--

آثار جانبية نادرة (تؤثر في شخص إلى ١٠ أشخاص من كل ١٠,٠٠٠ شخص) <ul style="list-style-type: none">التهاب نادر للبشرة قد يشمل ظهور رقع أو بثرات حمراء. طفح جلدي ناتج عن الحساسية المفرطة (قد ينتج عن أحد تفاعلات الحساسية أو تفاعلًا تلقائيًا). التهاب الأوعية الدموية الصغيرة مما يسبب تغير لون الجلد إلى اللون الأحمر أو الأرجواني. قد تظهر أعراض شديدة النثرة كآلام في المفاصل والمعدة والكلية؛ وتعرف هذه الحالة باسم "قشرية هينوخ شونلاين".

الآثار التي تصيب العظام <p>يعمل سينفاستروزول على خفض كمية هرمون الإستروجين في الجسم. الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض المحتوى المعدني للعظام. قد تصبح عظامك أكثر وهناً وأكثر عرضة للكسر. سيقوم طبيبك بتدرك هذه المخاطر وفقاً لإرشادات العلاج الخاصة بالعناية بصحة العظام لدى النساء اللاتي بلغن سن انقطاع الطمث. يجب التحدث مع طبيبك حول هذه المخاطر والاختيارات العلاجية.</p>

إذا تطورت أي من هذه الآثار الجانبية لدرجة خطيرة، أو إذا لاحظتِ حدوث أي آثار جانبية غير مدرجة بهذه النشرة فأخبري الطبيب أو الصيدلي.

الإبلاغ عن ظهور آثار جانبية <p>إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية فأخبري الطبيب أو الصيدلي. ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. يمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات المتصلة بسلامة هذا الدواء بإبلاغنا عن ظهور آثار جانبية له.</p>
٥- كيفية تخزين سينفاستروزول <p>يحفظ في درجة حرارة لا تزيد على ٣٠ °م.</p>
يحفظ هذا الدواء بعيداً عن مرأى و متناول الأطفال. تُحفظ الأقراص في مكان آمن حيث لا يمكن للأطفال رؤيتها أو الوصول إليها. فقد تسبب هذه الأقراص ضرراً لهم.
لا يُستهمل هذا الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية الموضح على العبوة وشرط الأقراص. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.
تُحفظ الأقراص في العبوة التي جاءت فيها.
ينبغي عدم التخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف أو النفايات المنزلية. أسألي الصيدلي عن طريقة التخلص من الأدوية التي لا تستعملينها. تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

٦- محتويات العبوة ومعلومات أخرى <p>يحتوي سينفاستروزول على:</p> <p>المادة الفعالة هي أناستروزول. يحتوي كل قرص مغلف على ١ ملجم أناستروزول.</p> <p>المكونات الأخرى هي:</p> <ul style="list-style-type: none">محتوى القرص من الداخل: مونوهيدرات اللاكتوز، واللاكتوز اللا مائي، وكاربوكسيميثيل الصوديوم المستخرج من البطاطس، والسليولوز الدقيق البلورات (E-460)، والسليليكا الغروانية الامائية وستيرات الماغنسيوم. الغلاف الخارجى للقرص: هايلروميلوز(E-464) وثنائي أكسيد التيتانيوم (E171) والماكروغول.

الشكل الصيدلي لدواء سينفاستروزول ومحتويات العبوة <p>يتوفر سينفاستروزول في شكل أقراص مغلفة بيضاء اللون، محدبة الوجهين، ومحفور على جانب واحد الرمز 1 .</p> <p>يتوفر سينفاستروزول في عبوة تحتوي على ٢٨ قرصاً (٤ شرائط يحتوي كل شريط على ٧ أقراص).</p>

الشركة مالكة حق التسويق والإفراج النهائي: <p>مختبرات سينفا، ش.م،</p> <p>شارع أولاز شيبى، ١٠ منطقة بوليغنو الصناعية، ٣١٦٢٠ أوارتي- نافارا، إسبانيا</p> <p>الشركة المصنعة:</p> <p>مختبرات سينفا، ش.م،</p> <p>شارع رونسيغاليس، ٣١٦٩٩ أويوتي، نافارا - إسبانيا.</p>
أجريت آخر مراجعة لهذه النشرة في فبراير ٢٠٢١.

هذا دواء <p>- الدواء هو منتج له تأثير على صحتك وتناوله بشكل مغاير لتعليمات قد يعرضك للخطر.</p> <p>- اتبع وصفة الطبيب بدقة، وكذلك إرشادات الاستعمال وتعليمات الصيدلي.</p> <p>- إن الطبيب والصيدلي خيران في الأدوية وفوائدها ومخاطرها.</p> <p>- لا توقف من تلقاء نفسك فترة العلاج المحددة في الوصفة الطبية.</p> <p>- لا تكرر نفس الوصفة دون استشارة الطبيب.</p> <p>- تحفظ كافة الأدوية بعيداً عن متناول أطفال.</p>
مجلس وزراء الصحة العرب <p>اتحاد الصيدالة العرب</p>