

Gliptacin 50 mg tablets

vildagliptin

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor, pharmacist or nurse.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

What is in this leaflet

1. What Gliptacin is and what it is used for
2. What you need to know before you take Gliptacin
3. How to take Gliptacin
4. Possible side effects
5. How to store Gliptacin
6. Contents of the pack and other information

1. What Gliptacin is and what it is used for

The active substance of Gliptacin is vildagliptin, belongs to a group of medicines called "oral antidiabetics".

Gliptacin is used to treat adult patients with type 2 diabetes. It is used when diabetes cannot be controlled by diet and exercise alone. It helps to control the level of sugar in the blood. Your doctor will prescribe Gliptacin either alone or together with certain other antidiabetic medicines which you will already be taking, if these have not proved sufficiently effective to control diabetes.

Type 2 diabetes develops if the body does not make enough insulin or if the insulin that the body makes does not work as well as it should. It can also develop if the body produces too much glucagon.

Insulin is a substance which helps to lower the level of sugar in the blood, especially after meals. Glucagon is a substance which triggers the production of sugar by the liver, causing the blood sugar level to rise. The pancreas makes both of these substances.

How Gliptacin works

Gliptacin works by making the pancreas produce more insulin and less glucagon. This helps to control the blood sugar level. This medicine has been shown to reduce blood sugar, which may help to prevent complications from your diabetes. Even though you are now starting a medicine for your diabetes, it is important that you continue to follow the diet and/or exercise which has been recommended for you.

2. What you need to know before you take Gliptacin

Do not take Gliptacin:

- if you are allergic to vildagliptin or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6). If you think you may be allergic to vildagliptin or any of the other ingredients of Gliptacin, do not take this medicine and talk to your doctor.

Warnings and precautions

Talk to your doctor, pharmacist or nurse before taking Gliptacin

- if you have type 1 diabetes (i.e. your body does not produce insulin) or if you have a condition called diabetic ketoacidosis.
- if you are taking an anti-diabetic medicine known as a sulphonylurea (your doctor may want to reduce your dose of the sulphonylurea when you take it together with Gliptacin in order to avoid low blood glucose [hypoglycaemia]).
- if you have moderate or severe kidney disease (you will need to take a lower dose of Gliptacin).
- if you are on dialysis.
- if you have liver disease.
- if you suffer from heart failure.
- if you have or have had a disease of the pancreas.

If you have previously taken vildagliptin but had to stop taking it because of liver disease, you should not take this medicine.

Diabetic skin lesions are a common complication of diabetes. You are advised to follow the recommendations for skin and foot care that you are given by your doctor or nurse. You are also advised to pay particular attention to new onset of blisters or ulcers while taking Gliptacin. Should these occur, you should promptly consult your doctor.

A test to determine your liver function will be performed before the start of Gliptacin treatment, at three- month intervals for the first year and periodically thereafter. This is so that signs of increased liver enzymes can be detected as early as possible.

Children and adolescents

The use of Gliptacin in children and adolescents up to 18 years of age is not recommended.

Other medicines and Gliptacin

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

Your doctor may wish to alter your dose of Gliptacin if you are taking other medicines such as:

- thiazides or other diuretics (also called water tablets)
- corticosteroids (generally used to treat inflammation)
- thyroid medicines
- certain medicines affecting the nervous system.

Pregnancy and breast-feeding

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

You should not use Gliptacin during pregnancy. It is not known if Gliptacin passes into breast milk. You should not use Gliptacin if you are breast-feeding or plan to breast-feed.

Driving and using machines

If you feel dizzy while taking Gliptacin, do not drive or use machines.

Gliptacin contains lactose

Gliptacin contains lactose (milk sugar). If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicine.

Gliptacin contains sodium

This medicine contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per tablet, that is to say essentially 'sodium free'.

3. How to take Gliptacin

Always take this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

How much to take and when

The amount of Gliptacin people have to take varies depending on their condition. Your doctor will tell you exactly how many tablets of Gliptacin to take. The maximum daily dose is 100 mg.

The usual dose of Gliptacin is either:

- 50 mg daily taken as one dose in the morning if you are taking Gliptacin with another medicine called a sulphonylurea.
- 100 mg daily taken as 50 mg in the morning and 50 mg in the evening if you are taking Gliptacin alone, with another medicine called metformin or a glitazone, with a combination of metformin and a sulphonylurea, or with insulin.
- 50 mg daily in the morning if you have moderate or severe kidney disease or if you are on dialysis.

How to take Gliptacin

- Swallow the tablets whole with some water.

How long to take Gliptacin

- Take Gliptacin every day for as long as your doctor tells you. You may have to take this treatment over a long period of time.

- Your doctor will regularly monitor your condition to check that the treatment is having the desired effect.

If you take more Gliptacin than you should

If you take too many Gliptacin tablets, or if someone else has taken your medicine, **talk to your doctor straight away**. Medical attention may be needed. If you need to see a doctor or go to the hospital, take the pack with you.

If you forget to take Gliptacin

If you forget to take a dose of this medicine, take it as soon as you remember. Then take your next dose at the usual time. If it is almost time for your next dose, skip the dose you missed. Do not take a double dose to make up for a forgotten tablet.

If you stop taking Gliptacin

Do not stop taking Gliptacin unless your doctor tells you to. If you have questions about how long to take this medicine, talk to your doctor.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Some symptoms need immediate medical attention:

You should stop taking Gliptacin and see your doctor immediately if you experience the following side effects:

- Angioedema (rare: may affect up to 1 in 1,000 people): Symptoms include swollen face, tongue or throat, difficulty swallowing, difficulties breathing, sudden onset rash or hives, which may indicate a reaction called "angioedema".
- Liver disease (hepatitis) (frequency not known): Symptoms include yellow skin and eyes, nausea, loss of appetite or dark-coloured urine, which may indicate liver disease (hepatitis).
- Inflammation of the pancreas (pancreatitis) (rare: may affect up to 1 in 1 000 people): Symptoms include severe and persistent pain in the abdomen (stomach area), which might reach through to your back, as well as nausea and vomiting.

Other side effects

Some patients have had the following side effects while taking Gliptacin:

- Very common (may affect more than 1 in 10 people): sore throat, runny nose, fever.
- Common (may affect up to 1 in 10 people): itchy rash, trembling, headache, dizziness, muscle pain, joint pain, constipation, swollen hands, ankles or feet (oedema), excessive sweating, vomiting, pain in and around the stomach (abdominal pain), diarrhoea, heartburn, nausea (feeling sick), blurred vision.
- Uncommon (may affect up to 1 in 100 people): weight increase, chills, weakness, sexual dysfunction, low blood glucose, flatulence.
- Rare (may affect up to 1 in 1000 people): inflammation of the pancreas.

Since this product has been marketed, the following side effects have also been reported:

- Frequency not known (cannot be estimated from the available data): localised peeling of skin or blisters, blood vessel inflammation (vasculitis) which may result in skin rash or pointed, flat, red, round spots under the skin's surface or bruising.

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store Gliptacin

- Keep this medicine out of the sight and reach of children.
- Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the blister and the carton after "EXP". The expiry date refers to the last day of that month.
- Store in the original package in order to protect from moisture.
- Do not store at temperatures above 30°C.
- Do not use any Gliptacin pack that is damaged or shows signs of tampering.

6. Contents of the pack and other information

What Gliptacin contains

- The active substance is vildagliptin. Each tablet contains 50 mg vildagliptin.
- The other ingredients are lactose anhydrous, microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate (type A), silica colloidal anhydrous (E551), sodium stearyl fumarate and low-substituted hydroxypropylcellulose.

What Gliptacin looks like and contents of the pack

Gliptacin 50 mg tablets are white cylindrical, flat-faced, bevelled-edge tablet, with "L" logo on one side.

Gliptacin 50 mg tablets are available in packs containing 28 (in 7 tablets blister x 4 packs) and 56 tablets (in 7 tablets blister x 8 packs).

Not all pack sizes may be marketed.

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer

LABORATORIOS CINFA, S.A.
OlazChipi,10. Polígono Industrial Areta,
31620 Huarte (Navarra) - Spain

This leaflet was last revised in 06/2023

This is a Medicament

- Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

**Council of Arab Health Ministers
Union of Arab Pharmacists**

النشرة الداخلية: معلومات للمريض

أقراص جليبتاسين ٥٠ ملجم

فيلداجليبتين

يرجى قراءة هذه النشرة الدوائية بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة.

- احتفظ بهذه النشرة؛ فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى فاسأل الطبيب، أو الصيدلي، أو الممرض.
- وصف هذا الدواء من أجلك أنت فقط. فلا تطعه لأي شخص آخر؛ فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر به، حتى وإن كانت أعراضه المرضية مشابهة لما تشعر به.
- إذا ظهر عليك أي آثار جانبية، فأخبر الطبيب، أو الصيدلي أو الممرضة. يشمل هذا أي آثار جانبية محتملة غير ولادة في هذه النشرة. انظر القسم ٤.

محتويات هذه النشرة

- ماهو جليبتاسين وماهي دواعي استعماله
- ما يجب معرفته قبل تناول دواء جليبتاسين
- الجرعة وطريقة الإستخدام
- الآثار الجانبية المحتملة
- حفظ الدواء
- محتويات العلبة ومعلومات أخرى

١- ماهو جليبتاسين وماهي دواعي استعماله

المادة الفعالة في دواء جليبتاسين هي فيلداجليبتين، وتنتمي إلى مجموعة من الأدوية تُعرف باسم "مضادات السكري عن طريق الفم". يُستخدم جليبتاسين لعلاج المرض البالغين المصابين بمرض السكري من النوع الثاني. كما أنه يُستخدم عندما يصعب التحكم في السكر في عن طريق الحمية الغذائية والتمارين الرياضية بمفردها. ويساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم. سوف يصف الطبيب دواء جليبتاسين إما مفردة أو مع أدوية معينة أخرى مضادة للسكري، والتي ربما تكون تتناولها بالفعل، وذلك في حال عدم ثبوت فاعليتها الكافية في التحكم في السكري.

يُصاب المرء بمرض السكري من النوع الثاني عندما يفقد الجسم قدرته على إنتاج كمية كافية من الإنسولين أو عندما لا يكون الإنسولين الذي ينتجه الجسم بالفاعلية المطلوبة. يمكن أن يظهر أيضاً عندما يُنتج الجسم كمية زائدة من الغلوكاغون.

الإنسولين هو مادة تساعد في خفض مستوى السكر في الدم، وخاصة بعد الوجبات. كما أن الغلوكاغون مادة تُحفّز إنتاج السكر بواسطة الكبد؛ مما يسبب ارتفاعاً في مستوى السكر في الدم. يصنع البنكرياس كلتا المادتين.

آلية عمل جليبتاسين

يُحقق جليبتاسين مفعوله من خلال تحفيز البنكرياس على إنتاج إنسولين أكثر وغلوكاغون أقل. ويساعد ذلك في التحكم في مستوى السكر في الدم. لقد ثبتت فاعلية هذا الدواء في خفض مستوى السكر في الدم؛ مما قد يساعد في الوقاية من الإصابة بمضاعفات مرض السكري. حتى وإن كنت ستبدأ الآن تناول دواء لمرض السكري، فمن المهم مواصلة اتباع الحمية الغذائية و/أو ممارسة التمارين الرياضية التي نصحت بها.

٢- ما يجب معرفته قبل تناول دواء جليبتاسين

لا تتناول دواء جليبتاسين:
إذا كنت تعاني من حساسية لمادة فيلداجليبتين أو أيٍّ من مكونات هذا الدواء (المدرجة في القسم ٦). إذا كنت تعتقد أنك ربما تكون مصاباً بحساسية لمادة فيلداجليبتين أو أيٍّ من المكونات الأخرى لدواء جليبتاسين فلا تتناول هذا الدواء وتحدث إلى الطبيب.

الاحتياطات والتحذيرات

تحدث إلى الطبيب، أو الصيدلي، أو الممرض قبل تناول جليبتاسين

- إذا كنت مصاباً بمرض السكري من النوع الأول (أي أن جسمك لا ينتج الإنسولين) أو إذا كنت مصاباً بمرض يُعرف باسم الغماض الكيتوني السكري.
- إذا كنت تتناول حالياً دواء مضاداً للسكري يُعرف باسم سلفونيل يوريا (فقد يرغب الطبيب في خفض جرعتك من سلفونيل يوريا عندما تتنوله بالتزامن مع جليبتاسين؛ لتجنب الإصابة بانخفاض في مستوى السكر في الدم).
- إذا كنت مصاباً بمرض كلوي خطير (سوف تحتاج إلى تناول جرعة أقل من جليبتاسين).
- إذا كنت تخضع للغسيل الكلوي.
- إذا كنت تعاني من مرض كبد.
- إذا كنت تعاني من قصور في القلب.
- إذا كنت مصاباً أو أصبت من قبل بمرض في البنكرياس.

إذا كنت قد تناولت من قبل دواء فيلداجليبتين، ولكنك اضطرت إلى التوقف عن تناوله بسبب اصابتك بمرض كبد، فعليك عدم تناول هذا الدواء.

تُعد آفات الجلد المرتبطة بالسكري من المضاعفات الشائعة لمرض السكري. يجب عليك اتباع التوصيات الخاصة بالعناية بالجلد والقدمين التي يقدمها لك الطبيب أو الممرض. يجب عليك أيضاً الانتباه جيداً لبداية ظهور بثور أو قرح أثناء تناول جليبتاسين. في حال حدوث ذلك، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور.

سيُجرى اختبار لفحص وظائف كبدك قبل بدء العلاج بدواء جليبتاسين و كل ثلاثة أشهر خلال فترة العلاج في العام الأول وبصفة دورية فيما بعد؛ وذلك للكشف عن علامات ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد مبكراً قدر الإمكان.

الأطفال والمراهقون

لا يُنصح باستخدام جليبتاسين من قِبل الأطفال والمراهقين الذين لم يبلغوا ١٨ عاماً.

تفاعلات جليبتاسين مع الأدوية الأخرى

أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أدوية أخرى. أو تناولتها مؤخراً، أو يُحتمل أن تتناولها.

قد يرغب الطبيب في تغيير جرعتك من دواء جليبتاسين إذا كنت تتناول أدوية أخرى مثل:

- الثيازيدات أو مدرّات البول (وتعرف أيضاً باسم أقراص الماء)
- الكورتيكوستيرويدات (تُستخدم بوجه عام لعلاج التهاب)
- أدوية الغدة الدرقية
- أدوية معينة تؤثر في الجهاز العصبي.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو تعتقدين أنك حامل، أو تخططين للحمل فاطلبي النصيحة من الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء.

يجب عليك عدم تناول جليبتاسين خلال فترة الحمل. ليس من المعروف ما إذا كان جليبتاسين يُفرّز في حليب الأم. يجب عليك عدم استخدام جليبتاسين إذا كنتِ تُرضعين أو تخططين لإرضاع طفلك.

القيادة وتشغيل الآلات

إذا شعرت بدوار أثناء فترة العلاج بدواء جليبتاسين فتجنب القيادة أو استخدام الآلات.

يحتوي جليبتاسين على اللاكتوز

يحتوي جليبتاسين على اللاكتوز (سكر الحليب). إذا أخرك الطبيب أنك تعاني من حساسية لبعض أنواع السكر فاستشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

يحتوي جليبتاسين على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من ١ مل مول (٢٣ ملجم) من الصوديوم في كل جرعة؛ أي أنه يكاد يكون خالياً من الصوديوم.

٣- الجرعة وطريقة الاستخدام

تناول هذا الدواء دائماً حسب وصف الطبيب. استشر الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً.

الكمية التي يجب تناولها وموعد تناولها

تختلف الكمية التي يجب تناولها من دواء جليبتاسين من شخص إلى آخر حسب حالته الصحية. سوف يشرح طبيبك بعدد أقراص جليبتاسين التي يجب تناولها. تبلغ الجرعة اليومية القصوى ١٠٠ ملجم.

تبلغ الجرعة العادية من جليبتاسين:

٥٠ ملجم يومياً تؤخذ كجرعة واحدة في الصباح إذا كنت تتناول جليبتاسين مع دواء آخر يُعرف باسم سلفونيل يوريا.

- ١٠٠ ملجم يومياً تُقسّم على جرعتين: ٥٠ ملجم في الصباح و٥٠ ملجم في المساء، إذا كنت تتناول جليبتاسين بمفرده، أو مع دواء آخر يُعرف باسم ميتفورمين أو غليتازون، أو مع كل من ميتفورمين وسلفونيل يوريا، أو مع الإنسولين.

- ٥٠ ملجم في الصباح إذا كنت مصاباً بمرض كلوي معتدل أو خطير أو إذا كنت تخضع للغسيل الكلوي.

كيفية تناول الدواء

- ابتلع القرص كاملاً بالماء.

مدة تناول جليبتاسين

تناول جليبتاسين طوال المدة التي أوصى بها طبيبك. قد تحتاج إلى تلقي هذا العلاج لفترة زمنية طويلة.

- سوف يقوم طبيبك بمراقبة حالتك بانتظام ليتأكد من نجاح الدواء في إحداث المفعول المطلوب.

تناول جرعة زائدة من جليبتاسين

إذا تناولت كمية زائدة من أقراص جليبتاسين، أو إذا تناول شخص ما دواءك عن طريق الخطأ، فتحدث إلى الطبيب على الفور. قد يتطلب الأمر عناية طبية طارئة. إذا اضطرت إلى زيارة الطبيب أو التوجه إلى المستشفى فاصطحب معك علبة الدواء. إذا نسيت تناول جليبتاسين

إذا نسيت تناول جرعة من هذا الدواء فتناولها بمجرد تذكر إياها. ثم تناول الجرعة التالية في وقتها المعتاد. إذا اقرب موعد تناول الجرعة التالية فلا تتناول الجرعة الفائتة. لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض القرص الذي نسيت.

إذا توقفت عن تناول جليبتاسين

لا تتوقف عن تناول جليبتاسين حتى يشرح الطبيب بذلك. إذا كان لديك أسئلة بشأن مدة العلاج بهذا الدواء فتحدث إلى الطبيب.

٤- الآثار الجانبية المحتملة

شأنه شأن جميع الأدوية قد يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، ولكنها لا تظهر بالضرورة على كل من يتناوله.

قد تحتاج بعض الأعراض إلى عناية طبية طارئة:

يجب عليك التوقف عن تناول جليبتاسين واستشارة الطبيب على الفور إذا ظهر عليك الآثار الجانبية التالية:

- وذمة وعائية (الآثار الجانبية النادرة: قد تؤثر في شخص واحد من كل ١٠٠٠ شخص): تشتمل الأعراض على تورم الوجه أو اللسان أو الحلق، وصعوبة في البلع، وصعوبة في التنفس، وظهور مفاجئ لطفح جلدي أو شرى قد يُشير إلى الإصابة بتفاعل حساسية يُعرف باسم "الوذمة الوعائية".
- مرض كبدى (التهاب الكبد) (الآثار الجانبية التي لا يُعرف عدد مرات حدوثها): تشتمل الأعراض على اصفرار الجلد والعينين، أو الشعور بالغثيان، أو فقدان الشهية، أو البول الداكن اللون، وقد يشير ذلك إلى الإصابة بمرض كبدى (التهاب الكبد).
- التهاب البنكرياس (الآثار الجانبية النادرة: قد تؤثر في شخص واحد من كل ١٠٠٠ شخص): تشتمل الأعراض على ألم شديد ودائم في البطن (منطقة المعدة)، وقد يمتد أحياناً إلى الظهر، بالإضافة إلى الشعور بالغثيان والقيء.

الآثار الجانبية الأخرى

أصيب بعض المرضى بالآثار الجانبية التالية أثناء تناول جليبتاسين:

- آثار جانبية شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من شخص واحد من كل ١٠ أشخاص): ألم في الحلق، سيلان الأنف، حمى.
- آثار جانبية شائعة (قد تؤثر على ما يصل إلى ١ من كل ١٠ أشخاص): طفح جلدي وحكة، ارتعاش، صناع، دوخة، آلام في العضلات، آلام المفاصل، إمساك، تورم اليدين والكاحلين أو القدمين (وذمة)، تعرق مفرط، قيء، ألم في وحول المعدة (ألم في البطن)، إسهال، حرقة، غثيان، عدم وضوح الرؤية.
- آثار جانبية غير شائعة (قد تؤثر على ما يصل إلى ١ من كل ١٠٠ شخص): زيادة الوزن، قشعريرة، ضعف، خلل وظيفي جنسي، انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم، وانتفاخ البطن.
- آثار جانبية نادرة (قد تؤثر على ما يصل إلى ١ من كل ١٠٠٠ شخص): التهاب البنكرياس.

منذ أن تم تسويق هذا المنتج، تم الإبلاغ أيضاً عن الآثار الجانبية التالية:

- آثار جانبية غير محددة المعدل (يتعذر تقدير معدل التكرار من خلال البيانات المتوفرة): تقشير موضعي للجلد أو بثور. يمكن الإصابة الدُموية الذي قد يؤدي إلى طفح جلدي أو بقع مدمية، مسطحة، حمراء، مستديرة تحت سطح الجلد أو كدمات.

الإبلاغ عن ظهور آثار جانبية

إذا ظهر عليك أي آثار جانبية، فأخبر الطبيب، أو الصيدلي أو الممرضة. يشمل هذا أي آثار جانبية محتملة غير ولادة في هذه النشرة. يمكنك المساهمة في تقديم المزيد من المعلومات المتعلقة بسلامة هذا الدواء بالإبلاغنا عن ظهور آثار جانبية له.

٥- حفظ الدواء

- يُحفظ هذا الدواء بعيداً عن مرأى ومتناول الأطفال.
- لا تتناول هذا الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية الموضح على الشريط والعلبة بعد كلمة "EXP". يُشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- يُحفظ في علبته الأصلية لعلمانيته من الرطوبة.
- يُحفظ الدواء في درجة حرارة لا تزيد على ٣٠ درجة مئوية.
- تجنب استخدام أي عينة تالفة من دواء جليبتاسين أو تظهر عليها علامات العبث بها.

٦- محتويات العلبة ومعلومات أخرى.

مكونات دواء جليبتاسين

- المادة الفعالة هي فيلداجليبتين. يحتوي كل قرص على ٥٠ ملجم من فيلداجليبتين.
- أما المكونات الأخرى فهي: اللاكتوز الامائي، والسليولوز الدقيق البلورات، صوديوم نشا جليكولات (النوع أ)، والسيليكا الغروانية الامائية (E551)، وفومرات ستيريل الصوديوم، وهيدروكسي بروبيل السليولوز المنخفض الاستبدال.

الشكل الصيدلي لدواء جليبتاسين ومحتويات العلبة

يتوفر دواء جليبتاسين ٥٠ ملجم في شكل أقراص بياض أسطوانية مسطحة ومشطوفة الحافة، محفور عليها الشعار "L".

على أحد جانبيها.

تتوفر أقراص جليبتاسين ٥٠ ملجم في عبوات تحتوي على ٢٨ قرصاً (٤ شرائط يحتوي كل شريط على ٧ أقراص) أو ٥٦ قرصاً (٨ شرائط يحتوي كل شريط على ٧ أقراص).

قد لا تتوفر جميع أحجام العبوات في الأسواق.

الشركة المالكة لحق التسويق والمُصنّعة

مختبرات سينفا، ش.م.

شارع أولاز شيبى، ١٠. منطقة بوليغون الصناعية،

٣١٦٢٠ أولازي (نافارا) | إسبانيا

أُجريت آخر مراجعة لهذه النشرة في يونيو ٢٠٢٣.

هذا دواء

- الدواء هو منتج له تأثير على صحتك وتناوله بشكل مغاير للتعليمات قد يعرضك للخطر.
- اتبع وصفة الطبيب بدقة، وذلك لإحداث الاستعمال وتعليمات الصيدلي.
- إن الطبيب والصيدلي خبيران في الأدوية وفوائدها ومخاطرها.
- لا توقف من تلقاء نفسك فترة العلاج المحددة في الوصفة الطبية.
- لا تكرر نفس الوصفة دون استشارة الطبيب.
- تحفظ كافة الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيدلة العرب