

- Treat cancers such as amifostine, cyclophosphamide or methotrexate.
- Increase blood pressure and slow heart rate such as noradrenaline.
- Treat gout such as probenecid, sulfinpyrazone and allopurinol.
- Lower blood fat levels such as colestyramine and colestipol.
- Lower blood sugar such as metformin or insulin.

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

Olmedine HCT with food and drink

Olmedine HCT can be taken with or without food.

Grapefruit juice and grapefruit should not be consumed by people who are taking Olmedine HCT. This is because grapefruit and grapefruit juice can lead to an increase in the blood levels of the active ingredient amlodipine, which can cause an unpredictable increase in the blood pressure lowering effect of Olmedine HCT.

Take care when drinking alcohol while you are taking Olmedine HCT as some people feel faint or dizzy. If this happens to you, do not drink any alcohol.

Elderly

If you are over 65 years of age your doctor will regularly check your blood pressure at any dose increase, to make sure that your blood pressure does not become too low.

Pregnancy and breast-feeding

Pregnancy

You must tell your doctor if you think that you are (or might become) pregnant. Your doctor will normally advise you to stop taking Olmedine HCT before you become pregnant or as soon as you know you are pregnant and will advise you to take another medicine instead of Olmedine HCT. Olmedine HCT is not recommended during pregnancy, and must not be taken when more than 3 months pregnant as it may cause serious harm to your baby if used after the third month of pregnancy.

If you become pregnant during therapy with Olmedine HCT please inform and see your physician without delay.

Breast-feeding

Tell your doctor if you are breast-feeding or about to start breast-feeding. Amlodipine and hydrochlorothiazide have been shown to pass into breast milk in small amounts. Olmedine HCT is not recommended for mothers, who are breast-feeding, and your doctor may choose another treatment for you if you wish to breast-feed.

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Driving and using machines

You may feel sleepy, sick or dizzy or get a headache while being treated for your high blood pressure. If this happens do not drive or use machines until the symptoms wear off. Ask your doctor for advice.

3. How to take Olmedine HCT

Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

- The recommended dose of Olmedine HCT is one tablet per day.
- The tablet can be taken with or without food. Swallow the tablet with some fluid (such as a glass of water). The tablet should not be chewed. Do not take the tablet with grapefruit juice.
- If possible, take your daily dose at the same time each day, for example at breakfast time.

If you take more Olmedine HCT than you should

If you take more tablets than you should you may experience low blood pressure with symptoms such as dizziness, fast or slow heart beat.

If you take more tablets than you should or if a child accidentally swallows some go to your doctor or nearest emergency department immediately and take your medicine pack or this leaflet with you.

Excess fluid may accumulate in your lungs (pulmonary oedema) causing shortness of breath that may develop up to 24-48 hours after intake.

If you forget to take Olmedine HCT

If you forget to take a dose take your normal dose the following day as usual. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you stop taking Olmedine HCT

It is important to continue to take Olmedine HCT unless your doctor tells you to stop.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. If side effects do occur they are often mild and do not require treatment to be stopped.

Although not many people may get them, the following two side effects can be serious:

Allergic reactions with swelling of the face, mouth and/or larynx (voice box) together with itching and rash may occur during treatment with Olmedine HCT. **If this happens stop taking Olmedine HCT and contact your doctor immediately.**

Severe light-headedness or fainting because Olmedine HCT can cause the blood pressure to fall too low in susceptible individuals. **If this happens stop taking Olmedine HCT, contact your doctor immediately and lay down flat.**

Frequency not known: If you experience yellowing of the whites of the eyes, dark urine, itching of the skin, even if you started therapy with Olmedine HCT longer time ago, **contact your doctor immediately** who will evaluate your symptoms and decide on how to continue your blood pressure medication.

Olmedine HCT is a combination of three active substances. The following information firstly gives the other side effects reported so far with the combination Olmedine HCT (besides those already mentioned above) and, secondly, those side effects, which are known for each of the separate substances or when two substances are given together.

To give you an idea of how many patients might get side effects, they have been listed as common, uncommon, rare and very rare.

These are the other side effects known about so far with Olmedine HCT:

If these side effects occur they are often mild and **you do not need to stop your treatment.**

Common

(may affect less than 1 in 10 people)

Upper respiratory tract infection; sore throat and nose; urinary tract infection; dizziness; headache; awareness of heartbeat; low blood pressure; nausea; diarrhoea; constipation; cramps; joint swelling; feeling more of an urge to pass urine; weakness; ankle swelling; tiredness; abnormal laboratory values.

Uncommon

(may affect less than 1 in 100 people)

Dizziness on standing up; vertigo; fast heartbeat; feeling faint; redness and warm feeling of the face; cough; dry mouth; muscular weakness; inability to get or maintain an erection.

These are the side effects, which are known for each of the separate substances or when two substances are given together:

They may be side effects for Olmedine HCT, even if they have not been seen so far with Olmedine HCT.

Very common

(may affect more than 1 in 10 people) Oedema (fluid retention).

Common

(may affect less than 1 in 10 people)

Bronchitis; stomach and gut infection; vomiting; increased blood sugar; sugar in urine; confusion; feeling sleepy; visual disturbance (including double vision and blurred vision); runny or stuffy nose; sore throat; difficult breathing; cough; abdominal pain; heartburn; stomach discomfort; flatulence; pain in the joints or bones; back pain; skeletal pain; blood in the urine; flu-like symptoms; chest pain; pain.

Uncommon

(may affect less than 1 in 100 people)

Reduced number of a type of blood cells known as platelets, which can result in bruising easily or a prolonged bleeding time; anaphylactic reactions; abnormally reduced appetite (anorexia); problems sleeping; irritability; mood changes including feeling anxious; feeling "down" or depressed; shiver; sleep disturbances; distorted sense of taste; loss of consciousness; reduced sense of touch; tingling sensations; worsening of shortsightedness; ringing in the ears (tinnitus); angina (pain or uncomfortable feeling in the chest, known as angina pectoris); irregular heart beat; rash; loss of hair; allergic inflammation of the skin; redness of skin; purplish spots or patches on the skin due to small haemorrhages (purpura); discolouration of the skin; red itchy bumps (hives); increased sweating; itching; eruption of the skin; skin reactions to light such as sunburn or rash; muscle pain; problems to pass urine; feeling urge to pass urine at night; breast enlargement in men; decreased sexual desire; swelling of the face; feeling unwell; weight increase or decrease; exhaustion.

Rare

(may affect less than 1 in 1,000 people)

Swollen and sore salivary glands; reduced number of white cells in the blood, which could increase the risk of infections; low red blood cell count (anaemia); bone marrow damage; restlessness; feeling uninterested (apathy); fits (convulsions); objects you look at appearing yellow; dry eyes; blood clots (thrombosis, embolism); fluid accumulation in the lungs; pneumonia; inflammation of blood vessels and small blood vessels in the skin; inflammation of the pancreas; yellowing of the skin and eyes; acute inflammation of the gall bladder; symptoms of lupus erythematosus such as rash, joint pains and cold hands and fingers; severe skin reactions including intense skin rash, hives, reddening of the skin over your whole body, severe itching, blistering, peeling and swelling of the skin, inflammation of mucous membranes (Stevens Johnson Syndrome, toxic epidermal necrolysis), sometimes lifethreatening; impaired movement; acute kidney failure; non-infectious kidney inflammation; poor kidney function; fever; intestinal angioedema: a swelling in the gut presenting with symptoms like abdominal pain, nausea, vomiting and diarrhoea.

إذا كان من المفترض أن تقوم بإجراء اختبارات لفحص وظائف الغدة الجار درقية، فيجب التوقف عن تناول أولميدين إتش سي في قبل القيام بهذه الاختبارات.

يجب أن تخبري طبيبك إذا كنت تعتقدين في وجود حمل (أو تخططين له). لا يُنصح باستعمال أولميدين إتش سي في في المراحل الأولى من الحمل، ولا يجب تناوله إذا تجاوزت فترة حملك ثلاثة أشهر؛ فمن المحتمل أن يُلحق ضرراً بالغاً بطولكِ في حال استعماله في هذه المرحلة (انظري قسم "الحمل والإرضاع").

الأطفال والمراهقون (أقل من ١٨ عاماً)

لا يُنصح بتناول أولميدين إتش سي في من قبل الأطفال والبالغين دون سن ١٨ عاماً.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى
آخر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول الأدوية التالية أو تناولتها مؤخراً أو من المحتمل أن تتناولها: الأدوية الأخرى المُحفَّضة لضغط الدم، حيث يمكن أن يتفاقم مفعول أولميدين إتش سي في. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير الجرعة (أو اتخاذ تدابير وقائية أخرى في الحالات التالية: إذا كنت تتناول أحد مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو مادة الأسبرين (انظر المعلومات الواردة تحت العنواين "لا تتناول أولميدين إتش سي في في الحالات التالية" و "التحذيرات والاحتياطات"). الليثيوم (دواء يُستخدم لعلاج التقلبات المزاجية وبعض أنواع الاكتئاب): إذ يؤدي استخدامه مع أولميدين إتش سي في إلى زيادة سُمية الليثيوم. إذا كان هناك ضرورة لتناول الليثيوم، فيستقيم الطبيب بقياس مستويات الليثيوم في دمك. ديلتيازيم وفيراپاميل، اللذان يُستخدمان لعلاج مشكلات عدم انتظام معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم. ريفامبينسن، أو إريثروميسين، أو كلاريثروميسين أو تراسيكلين أو سبارفلوكساسين، وهي مضادات حيوية تُستخدم لعلاج السُّل وأُواع أخرى من العدوى. نبته سانت جونز (العرن المنقوب). أحد العلاجات العشبية المُستخدمة لعلاج الاكتئاب. سيسابريد، الذي يُستخدم لزيادة حركة الطعام داخل المعدة والأمعاء. ديفيناميل، الذي يُستخدم لعلاج انخفاض معدل ضربات القلب أو الحد من إفراز العرق. هالوفانترين، الذي يُستخدم لعلاج المalarيا. فينكيتان IV، الذي يُستخدم لتحسين وصول الدورة الدموية إلى الجهاز العصبي. أمانتادين، الذي يُستخدم لعلاج مرض بركسون (شلل العراش). مكملات البوتاسيوم، بدائل الملح التي تحتوي على البوتاسيوم، "أقراص المياه" (مُدرات البول) الهيبارين (لعلاج تجلط الدم والوقاية من جلطات الدم)، مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (لعلاج انخفاض ضغط الدم)، المليئات، والسترويدات، الهرمون المنشط للغدة الكظرية (ACTH)، كاربينوكسولون (دواء يُستخدم لعلاج قرح المعدة أو تقرُّح القدم)، بنسلين ج صوديوم (مضاد حيوي يعرف أيضاً باسم بنزilin بنسيلين الصوديوم)، بعض مُسكنات الألم مثل حمض الساليسيليك ("الأسبرين") أو الساليسيلات. قد يؤدي استخدام هذه الأدوية في نفس الوقت مع أولميدين إتش سي في إلى تغيير مستويات البوتاسيوم في دمك. مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAID's) والأدوية المُستخدمة لتخفيف الألم والتورم والأعراض الأخرى للالتهاب، بما في ذلك التهاب المفاصل التي تُستخدم في نفس الوقت مع أولميدين إتش سي في. فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بالفشل الكلوي. - من شأن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية خفض مفعول أولميدين إتش سي في. في حال تناول جرعات عالية من الساليسيلات، قد يزيد تأثير السُّمية على الجهاز العصبي المركزي. الأقراص المُلمَّعة والمُهَيَّدة ومضادات الاكتئاب إذ يؤدي استخدامها مع أولميدين إتش سي في إلى حدوث انخفاض مفاجئ في ضغط الدم عند الوقوف. هيدروكلوريد كوليسيفيلام، عقار يُستخدم لخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويؤدي إلى خفض المفعول الذي تحدثه أقراص أولميدين إتش سي في. قد ينصحك طبيبك بتناول أولميدين إتش سي في قبل عقار هيدروكلوريد كوليسيفيلام بأربع ساعات على الأقل. بعض مضادات الحموضة (أدوية تُعسر الهضم وحرقة المعدة)، قد تؤدي إلى خفض مفعول أولميدين إتش سي في بشكل طفيف. بعض الأدوية التي تُستخدم لإرخاء العضلات مثل باكليفين وتيوبوكورارين. المواد المضادة للكتلين مثل الأثروبين والبيريدين. مكملات الكالسيوم. داتوولين (مستخلص طبي لعلاج حالات اللخلل الشديد في درجة حرارة الجسم). سيغفاستاتين، مادة تُستخدم لخفض مستويات الكوليسترول والدهون (الجليسريدات الثلاثية) في الدم. الأدوية المُستخدمة للحكم في الاستجابة المناعية لجسمك (مثل تراكوليموس، سيروليموس، تيمسيزوليموس، إيفيروليموس وسيكلوسبورين)، مما يُمكنه من قبول العضو المزروع.
أيضاً، أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول الأدوية التالية أو تناولتها مؤخراً أو من المحتمل أن تتناولها لأسباب التالية: علاج اضطرابات ذهنية شُديدة (مثل: ثيوريدازين، أو كلوروبرومازين، أو ليفوميومازين، أو ترايفلورازين، أو سياميانزين، أو سليبريد، أو اميسلرايد، أو بيموزيد، أو سولتوبريد، أو تيابريد، أو دروبيريدول، أو هالوبريدول). علاج ضغط الدم المنخفض (مثل: ديازوكسيد) أو ضغط الدم المرتفع (مثل: حصرات بيتا، أو مثيلدوبا)، فمن شأن أولميدين إتش سي في التأثير في آلية عمل هذه الأدوية. علاج مشكلات نظم القلب: (مثل: الميزولاستين، أو البينتاميدين، أو التريفينادين، أو الدوفيتيليد أو حقن الإيپوتيليد أو الإريثروميسين). علاج فيروس العوز المناعي البشري/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (مثل: ريتونافير، أو إندينافير، أو نيلفينافير). علاج العدوى الفطرية (مثل: كيتوكونازول، أو إتراكونازول، أو أمفوتريسين). علاج مضاعفات القلب (مثل: الكوينيدين، أو الهيدروكينيدين، أو الديسويراميد، أو الأميودارون، أو السوتاتول، أو البيريديل، أو الديجيتاليس). علاج الأورام السرطانية (مثل: أميفوستين، أو سيكلوفوسفاميد، أو ميثوتريكسات). علاج ارتفاع ضغط الدم وانخفاض معدل ضربات القلب (مثل: النورأدرينالين). علاج القرقر (مثل بروپينيسيد، أو سوفلينيلازول، أو ألوبيورينول). خفض مستويات الدهون في الدم (مثل الكليسترامين، أو الكوليستيپبول). خفض سكر الدم (مثل الميفورمين أو الأنسولين).
آخر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أدوية أخرى أو تناولتها مؤخراً أو من المحتمل أن تتناولها.

النشرة الداخلية: معلومات للمريض

أولميدين إتش سي في ٤٠ ملجم/ ٥ ملجم/ ٢٥ ملجم أقراص مُغلَّفة

أولميسلر تان ميڤوكسوميل/ أملوديين/ هيدروكلوروثيازيد

اقرأ هذه النشرة الدوائية بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء؛ لأنها تحتوي على معلومات تهكم.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى فاسأل الطبيب أو الصيدلي.
- وُصف هذا الدواء من أهلك فقط، فلا تعطه لغيرك؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بهم، حتى وإن كانت أعراضهم المرضية مشابهة لما تشعر به.
- إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية فاستشر الطبيب أو الصيدلي ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. انظر القسم ٤

محتويات هذه النشرة
١- ما هو أولميدين إتش سي في وما هي دواعي استعماله
٢- ما يجب معرفته قبل تناول أولميدين إتش سي في
٣- الجرعة وطريقة استخدام أولميدين إتش سي في
٤- الآثار الجانبية المحتملة
٥- كيفية تخزين أولميدين إتش سي في
٦- محتويات العلبة ومعلومات أخرى

١- ما هو أولميدين إتش سي في وماهي دواعي استعماله

يحتوي أولميدين إتش سي في على ثلاث مواد فعّالة تُسمى أولميسلر تان ميڤوكسوميل وأملوديين (في صورة أملوديين بيسيليت) وهيدروكلوروثيازيد. تساعد جميع هذه المواد الثلاثة في التحكم في مستوى ضغط الدم المرتفع.

- ينتمي أولميسلر تان ميڤوكسوميل إلى مجموعة من الأدوية تُعرّف "بمضادات مستقبلات الأنجيوتنسين الثاني"، الذي يعمل على خفض ضغط الدم من خلال إرخاء الأوعية الدموية.
- ينتمي أملوديين إلى مجموعة من المواد المعروفة "بمحصرات قنوات الكالسيوم". يعمل أملوديين أيضاً على خفض ضغط الدم من خلال إرخاء الأوعية الدموية.
- ينتمي هيدروكلوروثيازيد إلى مجموعة من المثاقير تُعرّف بمدرات البول الثيازيدية ("أقراص المياه"). ويعمل على خفض ضغط الدم من خلال مساعدة الجسم في التخلص من السوائل الزائدة من خلال الكلى التي تدّر البول على نحو أكبر.
- تُسمّم تأثيرات هذه المواد في خفض ضغط دمك.

يُستخدم دواء أولميدين إتش سي في لعلاج ضغط الدم المرتفع:

- لدى المرضى البالغين الذين لا يتم التحكم في ضغط الدم لديهم بصورة كافية عند تناول كل من أولميسلر تان ميڤوكسوميل وأملوديين معاً في صورة مزيج محدد الجرعة، أو
- لدى المرضى الذي يتناولون بالفعل مزيجاً محدد الجرعة من أولميسلر تان ميڤوكسوميل وهيدروكلوروثيازيد مع أملوديين في صورة قرص واحد، أو مزيجاً محدد الجرعة من أولميسلر تان ميڤوكسوميل وأملوديين مع هيدروكلوروثيازيد في صورة قرص واحد.

٢- ما يجب معرفته قبل تناول أولميدين إتش سي في

- لا تتناول أولميدين إتش سي في في الحالات التالية:
 - إذا كنت تعاني من الحساسية لمادة أولميسلر تان ميڤوكسوميل، أو أملوديين أو لأحد مجموعات محصرات قنوات الكالسيوم (مركبات ثنائي هيدرو البريديين، أو لمادة هيدروكلوروثيازيد أو المواد المشابهة لمادة هيدروكلوروثيازيد (السلفوناميدات)، أو لأي من مكونات هذا الدواء (المُدرّجة في قسم ٦). إذا كنت تعتقد أنك تعاني من الحساسية، فتحدث إلى طبيبك قبل تناول أولميدين إتش سي في.
 - إذا كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الكلى.
 - إذا كنت مصاباً بمرض السكري أو اعتلال في وظيفة الكلية وتتم معالجتك بدواء مخفض لضغط الدم يحتوي على مادة الأليسكربين.
 - إذا كنت تعاني من انخفاض مستوى البوتاسيوم أو الصوديوم في الدم، أو ارتفاع مستوى الكالسيوم أو حمض اليوريك في الدم (مع ظهور أعراض الإصابة بالنقرس أو تكوّن حصوات في الكلى) والتي لم تتحسن عند الخضوع للعلاج بهذا الدواء.
 - إذا تجاوزت فترة الحمل ثلاثة أشهر. يُفضّل أيضاً تجنب تناول أولميدين إتش سي في خلال المرحلة الأولى من الحمل - (انظر قسم الحمل والإرضاع")
 - إذا كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الكبد، أو إذا كان إفراز الصفراء ضعيفاً أو توقف تصريف الصفراء من المرارة (على سبيل المثال بسبب وجود حصوات في المرارة)، أو إذا كنت مصاباً بالصفراء (اصفرار الجلد والعينين).
 - إذا كنت تعاني من عدم وصول كمية كافية من الدم إلى الأنسجة مع ظهور أعراض مثل انخفاض ضغط الدم، وانخفاض النبض، وسرعة ضربات القلب بما في ذلك الصدمة قليلة، وتغني الصدمة بسبب وجود مشكلات خطيرة في القلب).
 - إذا كنت تعاني من انخفاض شديد في ضغط الدم،
 - بسبب بطء تدفق الدم من القلب أو إعاقلته، ويحدث ذلك عندما يصبح الوعاء الدموي أو الصمام الذي يحمل الدم بعيداً عن القلب ضيقاً (تضيّق الشريان الأبهر).
 - إذا كنت تعاني انخفاضاً في أداء القلب بعد التعرض لآزمة قلبية (احتشاء حاد في عضلة القلب). قد يُشعّر انخفاض أداء القلب بضيق في التنفس أو يصيبك بتورم في القدمين والكاحلين.
- لا تتناول أولميدين إتش سي في إذا انطلق أيّ من هذه الحالات عليك.

التحذيرات والاحتياطات

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أولميدين إتش سي في.
أخبر طبيبك إذا كنت تتناول الأدوية التالية لعلاج ضغط الدم المرتفع:
دواء مثبط للإنزيم المحول للأنجيوتنسين (مثل أنالابريل، ليزينوبريل، راميبريل)، وخاصة إذا كنت تعاني مشكلات في الكلية مرتبطة بداء السكري، أليسكربين.

قد يفحص طبيبك وظائف الكلى وضغط الدم وكمية الإلكتروليتات (مثل البوتاسيوم) في الدم لديك على فترات زمنية منتظمة.

انظر أيضاً للمعلومات الواردة تحت عنوان "لا تتناول دواء أولميدين إتش سي في "

أخبر طبيبك إذا كان لديك أيّ من المشكلات الصحية التالية:

- مشكلات في الكلى أو قمت بزراعة كلية.
- مرض في الكبد.
- قصور في القلب أو حدوث مشكلات في صمامات القلب أو عضلة القلب.
- القيء الشديد أو الإسهال أو العلاج بجرعات كبيرة من أقراص المياه (مُدرات البول) أو كنت تتبع حمية غذائية منخفضة الأملاح.
- ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم.
- مشكلات في الغدد الكظرية (الغدد المُنتِجة للهرمونات الموجودة في أعلى الكلى).
- مرض السكري.
- الذئبة الحمامية الجهازية (أحد أمراض المناعة الذاتية).
- الحساسية أو الربو.
- تفاعلات الجلد مثل الإصابة بحروق الشمس أو الطّفح الجلدي بعد التعرض للشمس أو استخدام حمام شمسي.
- إذا أصيبت من قبل بسلطان الجلد أو إذا ظهرت لديك فجأة آفات جلدية أثناء العلاج. قد يؤدي العلاج بمادة هيدروكلوروثيازيد، خاصةً العلاج على المدى الطويل بجرعات عالية إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان الجلد والشفاه (سرطان الجلد غير الميلاني). قم بحماية جلدك من التعرض للشمس ومن الأشعة فوق البنفسجية خلال فترة العلاج بدواء أولميدين إتش سي في.

- إذا كنت تعاني من مشاكل في التنفس أو الرئة (بما في ذلك الالتهاب أو سوائل في الرئتين) بعد تناول هيدروكلوروثيازيد في الماضي. إذا كنت تعاني من ضيق شديد في التنفس أو صعوبة في التنفس بعد تناول أولميدين إتش سي في، فاطلب أولميدين إتش سي في الفور.

استشر طبيبك إذا شعرت بألم في البطن، أو غثيان، أو قيء، أو إسهال بعد تناول أولميدين إتش سي في. سيقرر طبيبك العلاج المناسب. لا تتوقف عن تناول أولميدين إتش سي في من تلقاء نفسك.

اتصل بطبيبك على الفور إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية:

إسهال شديد، يدوم لفترة طويلة ويسبب فقداناً ملحوظاً في الوزن. سيُقيّم الطبيب هذه الأعراض ويقرر بشأن كيفية مواصلة تناول أدوية ضغط الدم.
ضعف في الرؤية أو ألم في العين. قد تكون هذه الحالات أعراضاً لآرام السائل داخل الغشاء الوعائي للعين (الارتشاح القرني) أو لارتفاع ضغط العين وقد يحدث ذلك خلال ساعات إلى أسابيع من تناول أولميدين إتش سي في، وقد يؤدي ذلك إلى اعتلال حاسة البصر بشكل دائم، في حال عدم علاجه.

شأنه شأن الأدوية الأخرى المتخصصة في خفض ضغط الدم المرتفع، قد يؤدي الانخفاض المفرط في ضغط الدم لدى المرضى المصابين باضطرابات في تدفق الدم في القلب أو المخ إلى حدوث آزمة قلبية أو سكتة، ولذا سيقيم طبيبك بفحص ضغط الدم لديك بعناية.