

Olmeppress 20 mg film-coated tablets

olmesartan medoxomil

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

What is in this leaflet

1. What Olmeppress is and what it is used for
2. What you need to know before you take Olmeppress
3. How to take Olmeppress
4. Possible side effects
5. How to store Olmeppress
6. Contents of the pack and other information

1. What Olmeppress is and what it is used for

Olmeppress belongs to a group of medicines called angiotensin-II receptor antagonists. They lower blood pressure by relaxing the blood vessels.

Olmeppress is used for the treatment of high blood pressure (also known as 'hypertension') in adults and in children and adolescents aged 6 to less than 18 years. High blood pressure can damage blood vessels in organs such as the heart, kidneys, brain and eyes. In some cases this may lead to a heart attack, heart or kidney failure, stroke or blindness. Usually high blood pressure has no symptoms. It is important to have your blood pressure checked to prevent damage occurring.

High blood pressure can be controlled with medicines such as Olmeppress tablets. Your doctor has probably also recommended that you make some changes in your lifestyle to help lower your blood pressure (for example losing weight, giving up smoking, reducing the amount of alcohol you drink and reducing the amount of salt in your diet). Your doctor may also have urged you to take regular exercise, such as walking or swimming. It is important to follow this advice from your doctor.

2. What you need to know before you take Olmeppress

Do not take Olmeppress:

- if you are allergic to olmesartan medoxomil or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6),
- if you are more than 3 months pregnant. (It is also better to avoid olmesartan medoxomil in early pregnancy – see pregnancy section),
- if you suffer from yellowing of the skin and eyes (jaundice) or problems with drainage of the bile from the gallbladder (biliary obstruction e.g. gallstones),
- if you have diabetes or impaired kidney function and you are treated with a blood pressure lowering medicine containing aliskiren.

Warnings and precautions

Talk to your doctor before using Olmeppress.

Tell your doctor if you are taking any of the following medicines used to treat high blood pressure:

- an ACE-inhibitor (for example enalapril, lisinopril, ramipril), in particular if you have diabetes-related kidney problems,
- aliskiren.

Your doctor may check your kidney function, blood pressure, and the amount of electrolytes (e.g. potassium) in your blood at regular intervals.

See also information under the heading "Do not take Olmeppress".

Tell your doctor if you have any of the following health problems:

- Kidney problems
- Liver disease
- Heart failure or problems with your heart valves or heart muscle,
- Severe vomiting, diarrhoea, treatment with high doses of water tablets (diuretics) or if you are on a low salt diet,
- Increased levels of potassium in your blood,
- Problems with your adrenal glands.

Contact your doctor if you experience diarrhoea that is severe, persistent and causes substantial weight loss. Your doctor may evaluate your symptoms and decide on how to continue your blood pressure medication.

As with any medicine which reduces blood pressure, an excessive drop in blood pressure in patients with blood flow disturbances of the heart or brain could lead to a heart attack or stroke. Your doctor will therefore check your blood pressure carefully.

You must **tell your doctor** if you think you are (or might become) pregnant. Olmesartan medoxomil is not recommended in early pregnancy, and must not be taken if you are more than 3 months pregnant, as it may cause serious harm to your baby if used at that stage (see pregnancy section).

Black patients

As with other similar drugs the blood pressure lowering effect of Olmeppress is somewhat less in black patients.

Elderly people

If you are 65 years or over and your doctor decides to increase your dose of olmesartan medoxomil to 40 mg daily, then you need to have your blood pressure regularly checked by your doctor to make sure that your blood pressure does not become too low.

Children and adolescents

Olmesartan medoxomil has been studied in children and adolescents. For more information, talk to your doctor. Olmesartan medoxomil is not recommended for children from 1 year to less than 6 years and should not be used in children under the age of 1 year as no experience is available.

Other medicines and Olmeppress

Tell your doctor or pharmacist if you are using, have recently used or might use any other medicines.

In particular, tell your doctor or pharmacist about any of the following:

- Other blood pressure lowering medicines, as the effect of olmesartan medoxomil can be increased. Your doctor may need to change your dose and/or to take other precautions:

If you are taking an ACE-inhibitor or aliskiren (see also information under the headings "Do not take Olmeppress" and "Warnings and precautions").

- Potassium supplements, a salt substitute which contains potassium, water tablets (diuretics) or heparin (for thinning the blood). Using these medicines at the same time as olmesartan medoxomil may raise the levels of potassium in your blood,
- Lithium (a medicine used to treat mood swings and some types of depression) used at the same time as olmesartan medoxomil may increase the toxicity of lithium. If you have to take lithium, your doctor will measure your lithium blood levels,
- Non-Steroidal Anti-Inflammatory (NSAIDs) medicines (medicines used to relieve pain, swelling and other symptoms of inflammation, including arthritis) used at the same time as olmesartan medoxomil may increase the risk of kidney failure and the effect of olmesartan medoxomil can be decreased by NSAIDs,
- Colesevelam hydrochloride, a drug that lowers the level of cholesterol in your blood, as the effect of olmesartan medoxomil may be decreased. Your doctor may advise you to take olmesartan medoxomil at least 4 hours before colesevelam hydrochloride,
- Certain antacids (indigestion remedies), as the effect of olmesartan medoxomil can be slightly decreased.

Olmeppress with food and drink

Olmeppress can be taken with or without food.

Pregnancy and breast-feeding

Pregnancy

You must **tell your doctor** if you think you are (or might become) pregnant. Your doctor will **normally** advise you to stop taking olmesartan medoxomil before you become pregnant or as soon as you know you are pregnant and will advise you to take another medicine instead of olmesartan medoxomil. Olmesartan medoxomil is not recommended in early pregnancy, and must not be taken when more than 3 months pregnant, as it may cause serious harm to your baby if used after the third month of pregnancy.

Breast-feeding

Tell your doctor if you are breast-feeding or about to start breast-feeding. Olmesartan medoxomil is not recommended for mothers who are breast-feeding, and your doctor may choose another treatment for you if you wish to breast-feed, especially if your baby is newborn, or was born prematurely.

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Driving and using machines

You may feel sleepy or dizzy while being treated for your high blood pressure. If this happens, do not drive or use machines until the symptoms wear off. Ask your doctor for advice.

Olmeppress contains lactose

This medicine contains lactose (a type of sugar). If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicinal product.

3. How to take Olmeppress

Always take this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

The recommended starting dose is one 10 mg tablet once a day. However, if your blood pressure is not controlled, your doctor may decide to change

your dose up to 20 or 40 mg once a day, or prescribe additional medicines. In patients with mild to moderate kidney disease, your dose will not be higher than 20 mg once a day.

The tablets can be taken with or without food. Swallow the tablets with a sufficient amount of water (e.g. one glass). If possible, take your daily dose at the same time each day, for example at breakfast time.

Children and adolescents from 6 to less than 18 years of age:

The recommended starting dose is 10 mg once daily. If the patient's blood pressure is not adequately controlled, the doctor may decide to change the dose up to 20 or 40 mg once a day. In children who weigh less than 35 kg, the dose will not be higher than 20 mg once a day.

If you take more Olmeppress than you should

If you take more tablets than you should or if a child accidentally swallows some, go to your doctor or nearest emergency department immediately and take your medicine pack with you.

If you forget to take Olmeppress

If you forget a dose, take your normal dose on the following day as usual. Do not take a double dose to make up for a forgotten tablet.

If you stop taking Olmeppress

It is important to continue to take Olmeppress unless your doctor tells you to stop.

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. If they do occur, they are often mild and do not require treatment to be stopped.

Although not many people may get them, the following two side effects can be serious:

On rare occasions (may affect up to 1 in 1,000 people) the following allergic reactions that may affect the whole body have been reported:

Swelling of the face, mouth and/or larynx (voice box) together with itching and rash may occur during treatment with olmesartan medoxomil. **If this happens stop taking Olmeppress and contact your doctor immediately.**

Rarely (but slightly more often in elderly people) olmesartan medoxomil can cause the blood pressure to fall too low in susceptible individuals or as the result of an allergic reaction. This could cause severe light-headedness or fainting. **If this occurs stop taking Olmeppress, contact your doctor immediately and lie down flat.**

Frequency not known: If you experience yellowing of the whites of the eyes, dark urine, itching of the skin, even if you started therapy with Olmeppress longer time ago, **contact your doctor immediately** who will evaluate your symptoms and decide on how to continue your blood pressure medication.

These are the other side effects known about so far with olmesartan medoxomil:

Common side effects (may affect up to 1 in 10 people):

Dizziness, headache, nausea, indigestion, diarrhoea, stomach ache, gastroenteritis, tiredness, sore throat, runny or stuffy nose, bronchitis, flu-like symptoms, cough, pain, pain in the chest, back, bones or joints, infection of the urinary tract, swelling of ankles, feet, legs, hands, or arms, blood in the urine.

Some changes in blood test results have also been seen and include the following: increased fat levels (hypertriglyceridaemia), increased uric acid levels (hyperuricaemia), rise in blood urea, increases in tests of liver and muscle function.

Uncommon side effects (may affect up to 1 in 100 people):

Quick allergic reactions that may affect the whole body and may cause breathing problems as well as a rapid fall of blood pressure that may even lead to fainting (anaphylactic reactions), swelling of the face, vertigo, vomiting, weakness, feeling unwell, muscular pain, skin rash, allergic skin rash, itching, exanthema (skin eruption), skin lumps (wheals), angina (pain or uncomfortable feeling in the chest).

In blood tests a reduction of the numbers of a type of blood cell, known as platelets has been seen (thrombocytopenia).

Rare side effects (may affect up to 1 in 1,000 people):

Lack of energy, muscle cramps, impaired kidney function, kidney failure.

Some changes in blood test results have also been seen. These include increased potassium levels (hyperkalaemia) and increased levels of compounds related to kidney function.

Additional side effects in children and adolescents:

In children, side effects are similar to those reported in adults. However, dizziness and headache are seen more often in children, and nose bleeding is a common side effect seen in children only.

Reporting of side effects

If you get any side effects talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store Olmeppress

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the box and on the blister strip ("EXP"). The expiry date refers to the last day of that month.

Do not store above 30°C.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help to protect the environment.

6. Contents of the pack and other information

What Olmeppress contains

The active substance is olmesartan medoxomil. Each film-coated tablet contains 20 mg olmesartan medoxomil. The other ingredients are microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, hydroxypropylcellulose, povidone, magnesium stearate and opadry Y-1-7000 (titanium dioxide (E171), macrogol and hypromellose) (See section 2 "Olmeppress contains lactose").

What Olmeppress looks like and contents of the pack

Olmeppress 20 mg film-coated tablets are white, cylindrical, biconvex, scored on one side and with OL2 on the other side.

Olmeppress 20 mg is supplied in packages containing 28 tablets (7-tablets blister packs).

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer

Laboratorios Cinfa, S.A.
Olaz-Chipi,10. Polígono Industrial Areta
31620 Huarte (Navarra) - Spain

This leaflet was last revised in March 2022.

This is a Medicament

- Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers
Union of Arab Pharmacists

الشرة الداخلية: معلومات للمريض

أولمبيرس ٢٠ ملجم أقراص مغلفة

أولميسلر تان ميوكوسميل

اقرأ هذه الشرة الدوائية بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء؛ لأنها تحتوي على معلومات تهمك.

- احتفظ بهذه الشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى فاسأل الطبيب أو الصيدلي.
- وصف هذا الدواء من أجلك فقط، فلا تطعه لغيرك؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بهم، حتى وإن كانت أعراضهم المرضية مشابهة لما تشعر به.
- إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية فاستشر الطبيب أو الصيدلي ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه الشرة. انظر القسم ٤.

محتويات هذه الشرة:

- ١- ما هو أولمبيرس وما هي دواعي استعماله
- ٢- ما يجب معرفته قبل تناول دواء أولمبيرس
- ٣- الجرعة وطريقة استخدام أولمبيرس
- ٤- الآثار الجانبية المحتملة
- ٥- كيفية تخزين أولمبيرس
- ٦- محتويات العلبة ومعلومات أخرى

١- ما هو أولمبيرس وما هي دواعي استعماله

ينتمي أولمبيرس إلى فئة من العقاقير تعرف بمضادات مستقبلات الأنجيوتنسين الثاني، التي تعمل على خفض ضغط الدم من خلال إرخاء الأوعية الدموية. يُستخدم عقار أولمبيرس لعلاج ضغط الدم المرتفع عند البالغين وعند الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ إلى أقل من ١٨ عام. ارتفاع ضغط الدم يتسبب في إلحاق الأوعية الدموية داخل الأعضاء مثل القلب والكلىين والمخ والعينين. في بعض الحالات، قد يؤدي إلى الإصابة بأزمة قلبية أو قصور في القلب أو فشل كلوي أو سكتة دماغية أو عى. عادة لا يرتبط لارتفاع ضغط الدم بحدوث أي أعراض. من المهم أن يتم فحص ضغط الدم بصورة منتظمة لتجنب حدوث أي ضرر. يمكن التحكم في ضغط الدم المرتفع بتناول الأدوية مثل أقراص أولمبيرس. قد ينصحك طبيبك بإدخال بعض التغييرات على نمط حياتك للمساعدة في خفض ضغط دمك (على سبيل المثال إنقاص الوزن والإقلاع عن التدخين وتقليل مقدار المشروبات الكحولية التي تتناولها وخفض كمية الملح في نظامك الغذائي). قد يتناقش معك الطبيب بشأن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي أو السباحة. من المهم أن تتبع هذه النصائح التي يقدمها لك الطبيب.

٢- ما يجب معرفته قبل تناول دواء أولمبيرس

- لا تتناول أولمبيرس:**
 - إذا كان لديك حساسية لمادة أولميسلر تان ميوكوسميل أو أي من مكونات الدواء الأخرى (المدرجة في قسم ٦).
- إذا تجاوزت فترة الحمل ثلاثة أشهر. (يُفضل أيضاً عدم تناول أولميسلر تان ميوكوسميل في مراحل الحمل الأول - انظر القسم الخاص بالحمل)
- إذا كنت تعاني إصفراراً في الجلد والعينين (الصفراء) أو مشكلات في تصريف العصارة الصفراوية من المرارة (التسدد القناة الصفراوية بسبب حصوات المرارة).
- إذا كنت مصاباً بداء السكري أو قصور في وظائف الكلى وتتم معالجتك بدواء خافض لضغط الدم يحتوي على مادة الأيسكترين.

الاحتياطات والتحذيرات

- تحدث إلى طبيبك قبل تناول أولمبيرس.
- سُخِرَ طبيبك إذا كنت تتناول أي من الأدوية التالية لعلاج ضغط الدم المرتفع:**
 - دواء مثبط للإنزيم المحول للأنجيوتنسين (مثل أتالابريل، ليزينابينريل، راميبيريل). وخاصة إذا كنت تعاني مشاكل في الكلى المرتبطة بداء السكري.
- أيسكترين
- قد يخضع طبيبك ووظائف الكلى وضغط الدم وكمية الأملاح (مثل البوتاسيوم) في الدم على فترات زمنية منتظمة.
- انظر أيضاً للمعلومات الواردة تحت عنوان "لا تتناول دواء أولمبيرس".

آخر طبيبك إذا كنت تعاني من أي من المشكلات الصحية التالية:

- مشكلات في الكلى
- مرض كبدى
- قصور في القلب أو مشكلات في صمامات القلب أو عذلة القلب
- التهى الشديد أو الإسهال أو الطحال بجعرات كبيرة من أقراص المياه (مدرات البول) أو كنت تتبع حمية غذائية منخفضة الأملاح.
- ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم.
- مشكلات في الكبد والكظرية.

اتصل بطبيبك إذا أصبت بإسهال شديد ودائم أدى إلى فقدان الوزن بشكل ملحوظ. سيُقيَّم ضغط هذه الأعراض ويقرر ما يلزم فيما يتعلق بتناول أدوية ضغط الدم. مثل كل الأدوية الأخرى التي تتعالج ضغط الدم المرتفع، قد يؤدي الانخفاض الشديد في ضغط الدم لدى المرضى المصابين باضطرابات في تدفق الدم إلى القلب أو المخ إلى حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية. وبالتالي ستقوم طبيبك بفحص ضغط الدم بعناية. يجب أن تخبري طبيبك إذا كنت تعتقدين في وجود حمل (**لا تُحَظِظِي لذلك**)، لا يُنصح باستعمال أولميسلر تان ميوكوسميل في مراحل الحمل الأولى، ويجب عدم تناوله إذا تجاوزت فترة حملك ثلاثة أشهر، فمن المحتمل أن يُلحق ضرراً بالجنين بطفلك في حالة استعماله في هذه المرحلة (انظر القسم الخاص بالحمل).

المرض ذوي البشرة السوداء

شأنه شأن الأدوية المماثلة الأخرى يكون المفعول الذي يحدثه أولمبيرس في خفض ضغط الدم أقل لدى المرضى ذوي البشرة السوداء.

الأشخاص الأكبر سناً

إذا كان عمرك يتجاوز ٦٥ عاماً واتخذ طبيبك قرراً بزيادة جرعة أولميسلر تان ميوكوسميل إلى ٤٠ ملجم يومياً، فإنك بحاجة إلى فحص ضغط دمك بانتظام عند الطبيب للتأكد من عدم انخفاضه بشكل مفرط.

الأطفال والمراهقون

تم دراسة تأثير أولميسلر تان ميوكوسميل على الأطفال والمراهقين. لمزيد من المعلومات تحدث إلى طبيبك.

لا ينصح بإعطائه أولميسلر تان ميوكوسميل للأطفال من عمر سنة إلى أقل من ٦ سنوات ولا يجب استعماله في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة لعدم توافر أي تجارب.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى:

- آخر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مؤخراً أو من المحتمل أن تتناول أي أدوية أخرى، بالأخص آخر طبيبك أو الصيدلي في حالة تناول أي من التالي:
 - الأدوية الأخرى الخافضة للضغط الدم، حيث يمكن أن يزيد تأثير أولميسلر تان ميوكوسميل.
 - قد يحدث طبيبك إلى تغيير الجرعة و/أو اتباع احتياطات أخرى.
- إذا كنت تتناول أحد مثبثات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو مادة السيكترين (انظر المعلومات الواردة تحت العنوانين "لا تتناول أولمبيرس" و"الاحتياطات والتحذيرات").
- مكملات البوتاسيوم، وهي بدائل أملاح تحتوي على البوتاسيوم، أو أقراص المياه (مدرات البول) أو اليبيرارين (لعلاج تجلط الدم). قد يؤدي استخدام هذه الأدوية في نفس الوقت مع أولميسلر تان ميوكوسميل إلى ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم.
- قد يؤدي استخدام الليثيوم (دواء يُستخدم لعلاج التقلبات المزاجية وبعض أنواع الاكتئاب) مع أولميسلر تان ميوكوسميل إلى زيادة سمية الليثيوم. إذا كان هناك ضرورة لتناول الليثيوم فسيقوم الطبيب بقياس مستويات الليثيوم في الدم.
- قد يؤدي استخدام مضادات التهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) (الأدوية المستخدمة تخفيف الألم والتورم وأعراض التهاب الأخرى، بما في ذلك التهاب المفاصل) في نفس الوقت مع أولميسلر تان ميوكوسميل إلى زيادة خطر الإصابة بالفشل الكلوي ويمكن أن يقلل تأثير عقار أولميسلر تان ميوكوسميل باستخدام مضادات التهاب غير الستيرويدية.
- هيدروكلوريد كوليستيلام، عقار يستخدم لخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويؤدي إلى خفض تأثير أولميسلر تان ميوكوسميل. قد ينصحك طبيبك بتناول أولميسلر تان ميوكوسميل قبل عقار هيدروكلوريد كوليستيلام بأربع ساعات على الأقل.
- بعض مضادات الصومعة (أدوية عسر الهضم)، قد تؤدي إلى خفض تأثير أولميسلر تان ميوكوسميل بشكل طفيف.

تناول أولمبيرس مع الطعام والشراب

يمكن تناول أولمبيرس مع الطعام أو بدونه.

الحمل والإرضاع

يجب أن تخبري طبيبك إذا كنت تعتقدين أنك حامل (أو تخططين لذلك). سيصحك الطبيب عادة بالتوقف عن تناول أولميسلر تان ميوكوسميل قبل أن تصبحي حاملاً أو بمجرد معرفتك أنك حامل وسيصحك بتناول دواء آخر بدلاً من أولميسلر تان ميوكوسميل. لا يُنصح باستعمال أولميسلر تان ميوكوسميل خلال مراحل الحمل الأول ويجب عدم تناوله إذا تجاوزت فترة حملك ثلاثة أشهر، فمن المحتمل أن يُلحق ضرراً بالجنين بطفلك في حالة استعماله بعد الشهر الثالث من الحمل.

الإرضاع

أخبري طبيبك إذا ما كنت تُرضعين أو على وشك الإرضاع. لا يُنصح باستعمال أولميسلر تان ميوكوسميل من قبل الأمهات أثناء فترة الإرضاع، وقد يختار طبيبك علاجاً آخر إذا كنت ترغبين في الإرضاع. وخاصة إذا كان طفلك حديث الولادة أو مولوداً قبل أوانه. إذا كنت حامل أو ترضعين أو إذا كنت تعتقدين أنك حامل أو تخططين لذلك استشري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

القيادة وتشغيل الآلات

قد تشعر بالتعب أو الدوار خلال فترة علاج ضغط الدم المرتفع. في حال حدوث ذلك، تجنّب القيادة أو استخدام الآلات حتى تختفي هذه الأعراض. لذلك، استشري الطبيب.

يحتوي أولمبيرس على اللاكتوز

يحتوي هذا الدواء على اللاكتوز (أحد أنواع السكر). إذا أخذك الطبيب بأنك تعاني من حساسية لبعض أنواع السكر فاستشر طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

٣- الجرعة وطريقة الاستخدام

تناول هذا الدواء دائماً حسب وصف الطبيب. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً.

الجرعة المبدئية الموصى بها هي قرص واحد ٢٠ ملجم يومياً، بالرغم من ذلك، في حال عدم ضبط مستوى ضغط الدم، قد يقرر طبيبك تغيير الجرعة لتصل إلى ٢٠ أو ٤٠ ملجم مرة واحدة يومياً، أو يصف لك أدوية إضافية. في حالة المرضى المصابين بمشكلات بسيطة إلى متوسطة في الكلى، لن تزيد الجرعة عن ٢٠ ملجم مرة واحدة يومياً.

يمكن تناول أقراص أولمبيرس مع الطعام أو بدونه. ابتلع الأقراص مع كمية كافية من الماء (على سبيل المثال، كوب من الماء). إن أمكن، تناول جرعتك اليومية في نفس الوقت من كل يوم، على

سبيل المثال في وقت الإفطار.
الأطفال والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ إلى أقل من ١٨ عام: الجرعة المبدئية الموصى بها هي ١٠ ملجم مرة واحدة يومياً. في حال عدم ضبط مستوى ضغط الدم لدى المريض، قد يقرر الطبيب تغيير الجرعة لتصل إلى ٢٠ أو ٤٠ ملجم مرة واحدة يومياً. في الأطفال الذين يقل وزنهم عن ٣٥ كيلوجرام، لن تزيد الجرعة عن ٢٠ ملجم مرة واحدة يومياً. تناول جرعة واحدة من أولمبيرس في حال تناول جرعة زائدة من الأقراص أو ابتلاع طفلك بعض الأقراص عن طريق الخطأ، توجه إلى الطبيب أو قسم الطوارئ بأقرب مستشفى على الفور واصطحب معك عبوة الدواء. إذا نسيت تناول أولمبيرس إذا نسيت تناول إحدى الجرعات فتناول الجرعة المحددة في اليوم التالي في موعدها الطبيعي. لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيتها. إذا توقفت عن تناول أولمبيرس من المهم مواصلة العلاج بدواء أولمبيرس حتى يخبرك الطبيب بخلاف ذلك. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى عن طريقة استخدام هذا المنتج فاسأل الطبيب أو الصيدلي.

٤- الآثار الجانبية المحتملة

مثل كل الأدوية، قد يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، ولكنها لا تظهر بالضرورة على كل من يتناوله. في حال حدوثها، غالباً ما تكون بسيطة ولا تستلزم إيقاف العلاج.

فيما يلي اثنين من الآثار الجانبية التي قد تكون خطيرة، على الرغم من عدم ظهور هذه الآثار في العديد من الأشخاص:

في حالات نادرة (قد تؤثر في شخص واحد من كل ١,٠٠٠ شخص) تم الإبلاغ عن تفاعلات حساسية التالية والتي قد تؤثر في الجسم بالكامل: قد يحدث تورم الوجه و/أو الفم و/أو الحنجرة (صندوق الصوت) مع الإصابة بالحكة والطفح الجلدي خلال فترة العلاج بدواء أولميسلر تان ميوكوسميل. **في حال حدوث ذلك توقف عن تناول أولمبيرس واتصل بطبيبك على الفور.**

نادرًا (غالباً ما يتكرر حدوثها في كبار السن) يمكن أن يتسبب أولميسلر تان ميوكوسميل في هبوط ضغط الدم هبوطاً شديداً في الأشخاص المعرضين لذلك أو كنتيجة لأحد تفاعلات الحساسية. قد يؤدي ذلك إلى حدوث دوار شديد أو إغماء. **في حال حدوث ذلك توقف عن تناول أولمبيرس واتصل بطبيبك على الفور واستلق على ظرك.**

معدل التكرار غير معروف: إذا كنت تعاني من إصفرار بياض العين، لون البول داكن، حكة في الجلد، مرض إذا كنت قد بدأت العلاج بأولمبيرس منذ فترة ، فاطصل بطبيبك على الفور الذي سيقوم أعراضك ويقرر كيفية الاستمرار في علاج ضغط الدم.

فيما يلي الآثار الجانبية الأخرى المرتبطة بدواء أولميسلر تان ميوكوسميل والمعروفة حتى الآن:

الآثار الجانبية الشائعة (قد تؤثر في شخص واحد من كل ١٠ أشخاص):

دوار، صاع، غثيان، عسر هضم، إسهال، ألم في البطن، التهاب في المعدة والأمعاء، شعور بالإجهاد، التهاب الحلق، رشح أو انسداد في الأنف، التهاب شحمي، أعراض شبيهة بالإنفلونزا، سعال، ألم، ألم في الصدر أو الظهر أو العظم أو المفاصل، عدوى الجهاز البولي، تورم الكاحل أو القدمين أو الساقين أو اليدين أو الذراعين، دم في البول.

لوحظ أيضاً حدوث بعض التغيرات في نتائج اختبار الدم وتشمل التالي: ارتفاع مستوى الدهون (قرط ثلاثي جليسرید الدم)، ارتفاع مستوى حمض اليوريك (قرط حمض اليوريك في الدم)، ارتفاع نسبة اليوريا في الدم، زيادة في نتائج اختبارات وظائف الكبد والعضلات.

الآثار الجانبية الغير شائعة (قد تؤثر في شخص واحد من كل ١٠٠ شخص):

تفاعلات حساسية سريعة من شأنها التأثير في الجسم بالكامل وقد تتسبب في حدوث مشكلات في التنفس بالإضافة إلى هبوط سريع في ضغط الدم الأمر الذي قد يؤدي إلى الإغماء ، تورم الوجه، دوخة، قىء، شعور بالضعف، شعور بالإغماء، ألم في العضلات، طفح جلدي، حكة، كتل جلدية (تور)، دخبة صدرية (شعور بألم في الصدر أو عدم الراحة).

سجلت اختبارات الدم انخفاضاً في أعداد نوع من أنواع خلايا الدم، تُعرف باسم الصفائح الدموية (نقص الصفائح الدموية).

الآثار الجانبية النادرة (قد تؤثر في شخص واحد من كل ١٠٠٠ شخص):

ظهرت أيضاً بعض التغيرات في نتائج اختبارات الدم. وتشمل هذه التغيرات ارتفاع مستوى البوتاسيوم (قرط بوتاسيوم الدم)، وزيادة مستويات المركبات ذات الصلة بوظائف الكلى.

الآثار الجانبية الإضافية لدى الأطفال والمراهقين:

تشابه الآثار الجانبية لدى الأطفال مع تلك الآثار التي يتم الإبلاغ عن حدوثها لدى البالغين. بالرغم من ذلك، فإن الدوار والصاع أكثر حدوثاً في الأطفال. ويُعد نزيف الأنف أثراً جانبياً شائعاً لدى الأطفال فقط.

الإبلاغ عن ظهور آثار جانبية

إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية فاستشر الطبيب أو الصيدلي. ويشمل هذا أي آثار جانبية محتملة غير ولدة في هذه الشرة. الإبلاغ عن ظهور آثار جانبية يساهم في زيادة المعلومات المتعلقة بسلامة هذا الدواء.

٥- كيفية تخزين أولمبيرس

يُحفظ هذا الدواء بعيداً عن مرأى و متناول الأطفال.

لا يستعمل هذا الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية الموضح على العلبة والشريط ("EXP"). ويشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر.

يحفظ الدواء في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠°م.

لا ينبغي التخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف أو النفايات المنزلية. أسأل الصيدلي عن طريقة التخلص من الأدوية التي لم تعد تستعملها. تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

٦- محتويات العلبة ومعلومات أخرى

يحتوي أولمبيرس على

المادة الفعالة هي أولميسلر تان ميوكوسميل

يحتوي كل قرص مغلف على ٢٠ ملجم أولميسلر تان ميوكوسميل.

المكونات الأخرى هي: سيلولوز دقيق البلورات، ومونوهيدرات اللاكتوز، وهيدروكسي بروبيل السيلولوز، وبوفيدون، وستيرات الماغنسيوم و أوباديرى Y-1-7000 (فاني أكسيد التيتانيوم (E171) ومارموجول وهايبروميوز) (انظر قسم ٣ "يحتوي أولمبيرس على اللاكتوز").

الشكل الصيدلي لدواء أولمبيرس ومحتويات العلبة

أقراص أولمبيرس ٢٠ ملجم تتوفر في شكل أقراص مغلفة أسطوانية محدبة الوجهين باللون الأبيض، محززة من المنتصف على أحد الجانبين ومحفور عليها "OL2" على الجانب الآخر.

تحتوي كل علبة على ٢٨ قرصاً، (٧ أقراص في كل شريط).

الشركة المصنعة المالكة لحق التسويق

مختبرات سينفا، ش.م.

شارع أولاز شبيب، ١٠ منطقة بوليغون الصناعية،

٢١٦٢٠ أواني (تافار) - إسبانيا

أُجريت آخر مراجعة لهذه الشرة في مارس ٢٠٢٢.

هذا دواء

- الدواء هو منتج له تأثير على صحتك وتناوله بشكل مغاير للتعليمات

قد يعرضك للخطر.

- اتبع وصفة الطبيب بدقة، وكذلك لإرشادات الاستعمال وتعليمات الصيدلي.

- إن الطبيب والصيدلي خبيران في الأدوية وفوائدها ومخاطرها.

- لا توافقت من تلقاء نفسك فترة العلاج المحددة في الوصفة الطبية.

- لا تكرر نفس الوصفة دون استشارة الطبيب.

- تحفظ كافة الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيدالة العرب