

Rybox 120 mg film-coated tablets

Etoricoxib
Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.
- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.
What is in this leaflet
1. What Rybox is and what it is used for
2. What you need to know before you take Rybox
3. How to take Rybox
4. Possible side effects
5. How to store Rybox
6. Contents of the pack and other information

1. What Rybox is and what it is used for What is Rybox? Rybox contains the active substance etoricoxib. Rybox is one of a group of medicines called selective COX-2 inhibitors. These belong to a family of medicines called non-steroidal anti- inflammatory drugs (NSAIDs). What is Rybox used for? Rybox helps to reduce the pain and swelling (inflammation) in the joints and muscles of people 16 years of age and older with osteoarthritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and gout. Rybox is also used for the short term treatment of moderate pain after dental surgery in people 16 years of age and older.
--

What is osteoarthritis? Osteoarthritis is a disease of the joints. It results from the gradual breakdown of cartilage that cushions the ends of the bones. This causes swelling (inflammation), pain, tenderness, stiffness and disability.
--

What is rheumatoid arthritis? Rheumatoid arthritis is a long term inflammatory disease of the joints. It causes pain, stiffness, swelling, and increasing loss of movement in the joints it affects. It may also cause inflammation in other areas of the body. What is gout? Gout is a disease of sudden, recurring attacks of very painful inflammation and redness in the joints. It is caused by deposits of mineral crystals in the joint. What is ankylosing spondylitis? Ankylosing spondylitis is an inflammatory disease of the spine and large joints.

2. What you need to know before you take Rybox Do not take Rybox: - if you are allergic (hypersensitive) to etoricoxib or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6) - if you are allergic to non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), including aspirin and COX-2 inhibitors (see Possible Side Effects, section 4) - if you have a current stomach ulcer or bleeding in your stomach or intestines - if you have serious liver disease - if you have serious kidney disease - if you are or could be pregnant or are breast-feeding (see ‘Pregnancy, breast feeding, and fertility’) - if you are under 16 years of age - if you have inflammatory bowel disease, such as Crohn's Disease, Ulcerative Colitis, or Colitis - if you have high blood pressure that has not been controlled by treatment (check with your doctor or nurse if you are not sure whether your blood pressure is adequately controlled) - if your doctor has diagnosed heart problems including heart failure (moderate or severe types), angina (chest pain) - if you have had a heart attack, bypass surgery, peripheral arterial disease (poor circulation in legs or feet due to narrow or blocked arteries) - if you have had any kind of stroke (including mini-stroke, transient ischaemic attack or TIA). Etoricoxib may slightly increase your risk of heart attack and stroke and this is why it should not be used in those who have already had heart problems or stroke.
--

Rybox with food and drink The onset of the effect of Rybox may be faster when taken without food.
--

Pregnancy, breast-feeding, and fertility <i>Pregnancy</i> Rybox tablets must not be taken during pregnancy. If you are pregnant or think you could be pregnant, or if you are planning to become pregnant, do not take the tablets. If you become pregnant, stop taking the tablets and consult your doctor. Consult your doctor if you are unsure or need more advice. <i>Breast-feeding</i> It is not known if Rybox is excreted in human milk. If you are breast-feeding, or planning to breast-feed, consult your doctor before taking Rybox. If you are using Rybox, you must not breast- feed. <i>Fertility</i> Rybox is not recommended in women attempting to become pregnant. Driving and using machines Dizziness and sleepiness have been reported in some patients taking etoricoxib. Do not drive if you experience dizziness or sleepiness. Do not use any tools or machines if you experience dizziness or sleepiness.
--

3. How to take Rybox Always take this medicine exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure. Do not take more than the recommended dose for your condition. Your doctor will want to discuss your treatment

٣. كيفية استعمال ريبوكس

تناول ريبوكس دائماً كما أخبرك طبيبك تماماً. ينبغي مراجعة طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً.

لا تتناول أكثر من الجرعة الموصى بها لحالتك. سوف يرغب طبيبك في مناقشة علاجك من وقت لآخر. ومن المهم أن تتناول أقل جرعة ممكنة يمكنكها أن تسيطر على الألم الذي تعاني منه، ولا ينبغي تناول ريبوكس لمدة أطول من المدة الضرورية لذلك. ويرجع هذا إلى إمكانية زيادة خطر حدوث النوبات القلبية أو السكتة بعد المعالجة الطويلة الأمد ، وخصوصاً في حالة تناول الجرعات العالية.

تتوافر عدة جرعات من هذا المستحضر الدوائي، وسوف يصف طبيبك جرعة القرص.

الجرعة الموصى بها:

التهاب المفاصل

تبلغ الجرعة الموصى بها ٣٠ ملجم مرة واحدة يومياً، تزيد إلى ٦٠ ملجم مرة واحدة يومياً

بحد أقصى إذا لزم الأمر.

التهاب المفاصل الروماتويدي

تبلغ الجرعة الموصى بها ٦٠ ملجم مرة واحدة يومياً، تزيد إلى ٩٠ ملجم مرة واحدة يومياً

بحد أقصى إذا لزم الأمر.

التهاب الفقار المتصلبي

تبلغ الجرعة الموصى بها ٦٠ ملجم مرة واحدة يومياً، تزيد إلى ٩٠ ملجم مرة واحدة يومياً

بحد أقصى إذا لزم الأمر.

حالات الألم الحادة

ينبغي استخدام الـإيتوريكوكسيب في فترة حدوث الألم الحاد فقط.

النقرس

تبلغ الجرعة الموصى بها١٢٠ ملجم مرة واحدة يومياً، والتي ينبغي أن تُستخدم أثناء فترة حدوث الألم الحاد فقط، وتقتصر على فترة معالجة تبلغ ٨ أيام بحد أقصى.

الألم التالي للجراحة السَّنية

تبلغ الجرعة الموصى بها ٩٠ ملجم مرة واحدة يومياً، وتقتصر على فترة معالجة تبلغ ٣ أيام بحد أقصى.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد إذا كنت تعاني من مرض كبدي خفيف، فينبغي عليك عدم تناول أكثر من ٦٠ ملجم في اليوم. إذا كنت تعاني من مرض كبدي متوسط الشدة، فينبغي عليك عدم تناول أكثر من ٣٠ ملجم في اليوم.

البالغون والمراهقون

يجب على الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن ١٦ عاماً عدم تناول ريبوكس.

كبار السن ليس هناك ضرورة لإجراء تعديل على الجرعة التي يتناولها كبار السن. وكما هو الحال مع الأدوية الأخرى، ينبغي توخي الحذر عند استخدامه في المرضى المُسنّين. طريقة الاستخدام إن ريبوكس معد لاستخدام عن طريق الفم. تناول الأقراص مرة واحدة في اليوم. يمكن تناول ريبوكس مع الطعام أو على معدة فارغة.
--

في حال تناولك أكثر مما ينبغي من ريبوكس

يجب عليك ألا تتناول أكثر من عدد الأقراص التي أوصى الطبيب بتناولها. وإذا ما تناولت الكثير من أقراص ريبوكس، يجب عليك طلب العناية الطبية في الحال.

في حال نسيان تناول ريبوكس من المهم أن تتناول ريبوكس طبقاً لوصف الطبيب. إذا نسيت تناول الجرعة، فتابع النظام العلاجي المُعتاد في اليوم التالي. لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المُنسية. وإذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء، فاسأل الطبيب أو الصيدلي.

٤. الآثار الجانبية المحتملة مثل كل الأدوية، قد يسبب ريبوكس آثاراً جانبية، ولكنها لا تظهر بالضرورة على كل من يتناوله. إذا ما تطوّرت أيُّ من هذه العلامات، فيجب عليك إيقاف ريبوكس واستشارة الطبيب في الحال (راجع ما يجب معرفته قبل تناول ريبوكس – القسم ٢): - ضيق النَّفْس، آلام في الصدر، أو ظهور تورم في الكاحل أو في حال تفاقم تورمه - اصفرار الجلد والعينين (اليِّقان) - وتُعدّ هذه علامات على حدوث مشاكل في الكبد - ألم شديد أو مستمر في المعدة أو في حال أصبح لون البراز داكناً - تفاعل تحسسي – والذي قد يشمل حدوث مشاكل جلدية مثل التقرحات والحبوب، أو تورم الوجه، أو الشفتين، أو اللسان أو الحنجرة والتي قد تتسبب في حدوث صعوبة في التنفّس.
--

يعرف تكرار حدوث الآثار الجانبية المحتملة المذكورة أدناه باستخدام المصطلحات التالية: شائعة جداً (تصيب أكثر من مريض واحد من كل ١٠ مرضى) شائعة (تصيب من ١٠٠١ مرضى من كل ١٠٠ مريض) غير شائعة (تصيب من ١٠٠١ مرضى من كل ١٠٠٠ مريض) نادرة الحدوث (تصيب من ١٠٠١ مرضى من كل ١٠,٠٠٠ مريض) نادرة الحدوث جدّاً (تصيب أقل من مريض واحد من كل ١٠,٠٠٠ مريض) قد تحدث الآثار الجانبية التالية أثناء العلاج ريبوكس:

شائعة جداً ألم في المعدة
شائعة - سِنْخ جاف (التهاب وألم بعد خلع الأسنان) - تورم الساقين و/أو القدمين بسبب احتباس السوائل (وذمة) - دوخة، صداع - خفقان (ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة) - ارتفاع ضغط الدم - الآزيز أو ضيق النَّفْس (تَشَجُّج قصبي) - إمساك، غزّات باليطن، التهاب المعدة (التهاب الغشاء المُبطّن للمعدة)، حرقة المعدة، الإسهال، عسر الهضم، غثيان، القيء، التهاب المريء، قرحات الفم. - تغيرات في نتائج اختبارات الدم المتعلقة بالكبد - حدوث كدمات - ضعف وتعب شبيه بأعراض الإنفلونزا

غير شائعة - التهاب المعدة والأمعاء (التهاب القناة الهضمية التي تشمل كلاً من المعدة والأمعاء الدقيقة؛ عدوى معدية، عدوى الجهاز التنفسي العلوي، عدوى الجهاز البولي - تغيرات في النتائج المخبرية (انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء، انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء، انخفاض في الصفائح الدموية)

- فرط الحساسية (تفاعل تحسسي ويشمل حدوث الحَرى وهو ما يكون خطيراً بدرجة كافية تستدعي معها طلب العناية الصحية الفورية)
- زيادة الشهية أو نقصانها، زيادة الوزن
- القلق، الاكتئاب، انخفاض التركيز؛ رؤية وسماع أشياء غير موجودة (هلاوس)
- تغيرات في حاسة التذوق، عدم القدرة على النوم، التنميل أو الإحساس بالنخز، النعاس
- عدم وضوح الرؤية، تهيج العين واحمرارها
- طنين في الأذنين، دُوار (الإحساس بالدُّوار دون تغيير الوضعية)
- اختلال ضربات القلب (رَجْفان آذيني)، تسارع ضربات القلب، فشل القلب، الشعور بالضيق، ضغط أو ثَقَل في الصدر (الذبحة الصدرية)، نوبات قلبية
- احمرار الوجه، سكتة دماغية، سكتة دماغية صُغرى (قصور وُقعي في الدورة الدموية للمخ)، ارتفاع حاد في ضغط الدم، التهاب الأوعية الدموية
- السُّعال، عُسْر التنفّس، نزيف الأنف
- انتفاخ المعدة أو الأمعاء، تغيرات في الوظائف الطبيعية للأمعاء، جفاف الفم، قرحة المعدة، التهاب الغشاء المُبطّن للمعدة والذي قد يكون خطيراً مما يؤدي إلى حدوث النزيف، متلازمة القولون المُتَهَيِّج (القولون العصبي)، التهاب البنكرياس
- تورم الوجه، طفح جلدي أو حكة، احمرار الجلد
- مَقْص/تشجّع العضلات، ألم/ تَبَيُّس العضلات
- وجود كميات كبيرة من البوتاسيوم في الدم، تغيرات في نتائج اختبارات الدم أو البول المتعلقة بالكليتين، مشاكل كلوية خطيرة
- ألم في الصدر

- نادرة الحدوث**
- وذمة وعائية (تفاعل تحسسي يترافق مع حدوث تورم الوجه، الشفتين، اللسان وأو الحنجرة والتي قد تتسبب في حدوث صعوبة في التنفّس أو البلع، والتي قد تكون خطيرة بدرجة كافية مما يستدعي طلب العناية الطبية في الحال) /تفاعلات فرط حساسية حاد و مفاجئ وتشمل حدوث صدمة (وهو عبارة عن تفاعل تحسسي خطير يستدعي طلب العناية الطبية في الحال)
 - ارتباك، قلق
 - مشاكل كبدية (التهاب الكبد)
 - انخفاض مستويات الصوديوم في الدم
 - فشل الكبد، اصفرار الجلد و/أو العينين (اليِّقان)
 - تفاعلات جلدية شديدة

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية، فاستشر الطبيب أو الصيدلي. ويشمل هذا أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. يمكنك المساعدة في تقديم معلومات أكثر حول أمان هذا الدواء.

٥. كيفية تخزين الدواء يحفظ الدواء بعيداً عن مرأى ومتناول الأطفال. لا تستعمل هذا الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العلبة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر. لا تخزن ريبوكس في درجة حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية. يرجى التخزين في العلبة الأصلية لحمايتها من الرطوبة. لا ينبغي التخلص من الأدوية عبر مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستعمل. سوف تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.
--

٦. محتويات العلبة ومعلومات أخرى

- يحتوى ريبوكس على**
- المادة الفعالة هي الـإيتوريكوكسيب. يحتوي كل قرص مغلف على ١٢٠ ملجم من الـإيتوريكوكسيب.
- تشمل المكونات الأخرى:

الطبقة الداخلية للقرص: نشا ذرة مُحول مسبقاً إلى جيلاتين، سيلولوز دقيق البلورات، كروكساميلوز الصوديوم، ثاني أكسيد السيليكون الغَرَواني، هيدروكسي بروبيل سيلولوز، ستيرات المغنيزيوم.

غلاف القرص: أوبادري 7000-٢٠1، ويحتوي قرص ال ١٢٠ ملجم على أكسيد

الحديد الأصفر(E-172)، والقرمز النبلي الأرجواني (E-١32).

شكل ومحتويات علبة ريبوكس

ريبوكس ١٢٠ ملجم أقراص مغلفة ذات لون أخضر فاتح، أسطوانية الشكل، محدبة

الوجهين محفور عليها الرمز E12. تحتوي كل علبة على ٧ أقراص (شريط واحد يحتوي

على ٧ أقراص).

الشركة المصنعة المالكة لحق التسويق مختبرات سينفا، ش.م. شارع أولاز شيببي، ١٠ منطقة بوليغنو الصناعية ٣١٦٢٠ أوراتي (نافارا) - إسبانيا

أُجريت آخر مراجعة لهذه النشرة في ابريل ٢٠١٦.

هذا دواء - الدواء هو منتج له تأثير على صحتك وتناوله بشكل مغاير للتعليمات قد يعرضك للخطر. - اتبع وصفة الطبيب بدقة، وكذلك لإرشادات الاستعمال وتعليمات الصيدلي. - إن الطبيب والصيدلي خبيران في الأدوية وفوائدها ومخاطرها. - لا توقف من تلقاء نفسك فترة العلاج المحددة في الوصفة الطبية. - لا تكرر نفس الوصفة دون استشارة الطبيب. - تحفظ كافة الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.
مجلس وزراء الصحة العرب اتحاد المبادلة العرب

النشرة الداخلية: معلومات للمريض

ريوكس ١٢٠ ملجم - أقراص مغلفة

إيتوريكوسيب

يرجى قراءة هذه النشرة الدوائية بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات تهمك.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.

- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، فاسأل الطبيب أو الصيدلي.

- وُصف هذا الدواء من أجلك فقط، فلا تعطه لغيرك؛ فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بهم، حتى وإن كانت أعراضهم المرضية مشابهة لما تشعر به.

- إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية، فاستشر الطبيب أو الصيدلي. ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. انظر القسم ٤.

محتويات النشرة	
١. ما هو ريوكس وما دواعي استعماله	
٢. ما يجب معرفته قبل تناول ريوكس	
٣. كيفية استعمال ريوكس	
٤. الآثار الجانبية المحتملة	
٥. كيفية تخزين ريوكس	
٦. محتويات العلبة ومعلومات أخرى	

١. **ما هو ريوكس وما دواعي استعماله**

ما هو ريوكس؟

يحتوي ريوكس على المادة الفعالة إيتوريكوسيب. ينتمي ريوكس إلى فئة من الأدوية تُدعى مثبطات إنزيم السيكلوأكسجيناز- ٢ الانتقائية. وتنتمي هذه الفئة إلى مجموعة من الأدوية تُدعى الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية.

ما هي استعمالات ريوكس؟

- يساعد ريوكس في خفض حدة الألم والتورم (الالتهاب) في المفاصل والعضلات في الأشخاص الذين يبلغون من العمر ١٦ عاماً فأكثر والذين يعانون من التهاب المفاصل، والتهاب المفاصل الروماتيزمي، و التهاب الفقار التصلبي والتقرس.
- ويستعمل ريوكس في العلاج القصير الأمد للألم المتوسط الشدة الناجم عن إجراء عملية جراحية في الأسنان في الأشخاص الذين يبلغون من العمر ١٦ عاماً فأكثر.

ما هو التهاب المفاصل ؟

التهاب المفاصل مرض يصيب المفاصل. ينتج عن تآكل تدريجي للغضاريف التي تكسو أطراف العظام، حيث تعمل هذه الغضاريف كوسائد تلطف من حركة العظام. يؤدي هذا الالتهاب الي حدوث التورم (الالتهاب)، والألم، والتألم عند اللمس أو الضغط، والتيبس وإعاقة في الاستخدام الطبيعي للجزء المصاب.

ما هو التهاب المفاصل الروماتيزمي؟

التهاب المفاصل الروماتيزمي هو التهاب طويل الأمد يصيب المفاصل. ويسبب حدوث الألم، والتيبس، والتورم، وفقدان قدرة المفاصل المصابة به على الحركة. كما يمكن أن يسبب حدوث الالتهاب في أجزاء أخرى من الجسم.

ما هو التقرس؟

التقرس هو مرض يتميز بحدوث نوبات مفاجئة ومتكررة من الالتهاب المؤلم والاحمرار في المفاصل. وهو ناجم عن ترسب البلورات المعدنية في المفصل.

ما هو التهاب الفقار التصلبي
التهاب الفقار التصلبي هو التهاب يصيب العمود الفقري والمفاصل الكبيرة.

٢. ما يجب معرفته قبل تناول ريوكس
لا تتناول ريوكس:
- إذا كنت تعاني من حساسية (مُفرط التحسس) للإيتوريكوسيب أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المُدرجة في القسم ٦). - إذا كنت تعاني من حساسية لأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية، ويشمل ذلك الأسبرين ومثبّطات إنزيم السيكلوأكسجيناز-٢ (انظر الآثار الجانبية المُحتملة، القسم ٤). - إذا كنت تعاني من قرحة في المعدة في الوقت الحالي أو من نزيف في المعدة أو الأمعاء. - إذا كنت تعاني من مرض كبدي شديد - إذا كنت تعاني من مرض كلوي شديد - إذا كنت حاملاً أو هناك إمكانية لحدوث الحمل أو كنتِ مرضعه (انظر 'الحمل، الإرضاع والخصوبة'). - إذا كنت دون سن ١٦ عاماً - إذا كنت تعاني من داء الأمعاء الالتهابي، مثل داء كرون، أو التهاب القولون التقرّحي أو التهاب القولون - إذا كنت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم غير مُتحكّم به عن طريق الأدوية (تحقق من طبيبك أو المعرّضة إذا كنت غير متأكد ما إذا كان ضغط الدم لديك مضبوط بدرجة ملائمة) - إذا شخّص طبيبك وجود مشاكل قلبية ويشمل ذلك فشل القلب (الأنواع المتوسطة الشدة أو الشديدة)، الذبحة الصدرية (ألم في الصدر) - إذا كنت تعاني من حدوث نوبة قلبية، أو خضعت لعملية تغير في الشرايين، أو أمراض الشرايين الطرفية (دورة دموية ضعيفة في الساقين أو القدم نتيجة لتضيّق الشرايين أو انسدادها) - إذا كنت تعاني من حدوث السكتة الدماغية (ويشمل ذلك السكتة الدماغية الصّغرى، أو قصور وفتي في الدورة الدموية للمخ)
قد يزيد الإيتوريكوسيب من خطر حدوث النوبات القلبية والسكتة الدماغية بدرجة طفيفة؛ ولهذا السبب لا ينبغي أن يُستخدم في هؤلاء المرضى المصابين فعلياً بمشاكل قلبية أو سكتات دماغية .
إذا كنت تعتقد أن أي من هذه ذات صلة لك، لا تأخذ أقراص حتى تستشير الطبيب.

الاحتياطات والتحذيرات

تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل البدء في تناول ريوكس إذا:

- إذا كان لديك تاريخ مرضي سابق لحدوث نزيف في المعدة أو قرحة.
- إذا كنت تعاني من نقص في السوائل، على سبيل المثال، ناجم عن نوبات طويلة من القيء أو الإسهال.
- إذا كنت تعاني من تورم نتيجة لاحتباس السوائل.
- إذا كان لديك تاريخ مرضي سابق لحدوث فشل القلب، أو أي نوع آخر من الأمراض القلبية.
- إذا كان لديك تاريخ مرضي سابق لارتفاع ضغط الدم، فقد يزيد إيتوريكوسيب

- changes in laboratory values (decreased number of red blood cells, decreased number of white blood cells, platelets decreased)
- hypersensitivity (an allergic reaction including hives which may be serious enough to require immediate medical attention)
- appetite increases or decreases, weight gain
- anxiety, depression, decreases in mental sharpness; seeing, feeling or hearing things that are not there (hallucinations)
- taste alteration, inability to sleep, numbness or tingling, sleepiness
- blurred vision, eye irritation and redness
- ringing in the ears, vertigo (sensation of spinning while remaining still)
- abnormal heart rhythm (atrial fibrillation), fast heart rate, heart failure, feeling of tightness, pressure or heaviness in the chest (angina pectoris), heart attack
- flushing, stroke, mini-stroke (transient ischaemic attack), severe increase in blood pressure, inflammation of the blood vessels
- cough, breathlessness, nose bleed
- stomach or bowel bloating, changes in your bowel habits, dry mouth, stomach ulcer, inflammation of the stomach lining that can become serious and may lead to bleeding, irritable bowel syndrome, inflammation of the pancreas
- swelling of the face, skin rash or itchy skin, redness of the skin
- muscle cramp/spasm, muscle pain/stiffness
- high levels of potassium in your blood, changes in blood or urine tests relating to your kidney, serious kidney problems
- chest pain

Rare:

- angioedema (an allergic reaction with swelling of the face, lips, tongue and/or throat which may cause difficulty in breathing or swallowing, which may be serious enough to require immediate medical attention)/anaphylactic/anaphylactoid reactions including shock (a serious allergic reaction that requires immediate medical attention)
- confusion, restlessness
- liver problems (hepatitis)
- low blood levels of sodium
- liver failure, yellowing of the skin and/or eyes (jaundice)
- severe skin reactions

Reporting of side effects

If you get any side effects talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store Rybox

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton. The expiry date refers to the last day of that month.

Do not store Rybox above 30° C.

Store in the original package in order to protect from moisture.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

6. Contents of the pack and other information

What Rybox contains

- The active substance is etoricoxib. Each film coated tablet contains 120 mg of etoricoxib.

- The other ingredients are:
Core: pregelatinized maize starch, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, colloidal silicon dioxide, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate.
Tablet coating: opadry Y-1-7000.
The 120-mg tablets also contain iron oxide yellow (E172) and indigo carmine lake (E132).

What Rybox looks like and contents of the pack

Rybox 120 mg film-coated tablets are pale-green, cylindrical, biconvex and embossed with code E12. Each pack contains 7 tablets (7’s Blister x 1).

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer
Laboratorios Cinfa, S.A.
Olaz-Chipi, 10 - Polígono Industrial Areta
31620 Huarte (Navarra) – Spain

This leaflet was last revised in April 2016.

This is a Medicament - Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you. - Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. - The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks. - Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you. - Do not repeat the same prescription without consulting your doctor. - Keep all medicaments out of reach of children.
Council of Arab Health Ministers Union of Arab Pharmacists

from time to time. It is important that you use the lowest dose that controls your pain and you should not take Rybox for longer than necessary. This is because the risk of heart attacks and strokes might increase after prolonged treatment, especially with high doses.

There are different strengths available for this medicinal product and depending on your disease your doctor will prescribe the tablet strength that is appropriate for you.

The recommended dose is:

Osteoarthritis

The recommended dose is 30 mg once a day, increase to a maximum of 60 mg once a day if needed.

Rheumatoid arthritis

The recommended dose is 60 mg once a day, increased to a maximum of 90 mg once a day if needed.

Ankylosing spondylitis

The recommended dose is 60 mg once a day, increased to a maximum of 90 mg once a day if needed.

Acute pain conditions

Etoricoxib should be used only for the acute painful period.

Gout

The recommended dose is 120 mg once a day which should only be used for the acute painful period, limited to a maximum of 8 days treatment.

Postoperative dental surgery pain

The recommended dose is 90 mg once daily, limited to a maximum of 3 days treatment.

People with liver problems

- If you have mild liver disease, you should not take more than 60 mg a day.
- If you have moderate liver disease, you should not take more than 30 mg a day.

Use in children and adolescents

Rybox tablets should not be taken by children or adolescents under 16 years of age.

Elderly

No dose adjustment is necessary for elderly patients. As with other medicines, caution should be exercised in elderly patients.

Method of administration

Rybox is for oral use. Take the tablets once a day. Rybox can be taken with or without food.

If you take more Rybox than you should

You should never take more tablets than the doctor recommends. If you do take too many Rybox tablets, you should seek medical attention immediately.

If you forget to take Rybox

It is important to take Rybox as your doctor has prescribed. If you miss a dose, just resume your usual schedule the following day. Do not take a double dose to make up for the forgotten tablet.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

If you develop any of these signs you should stop Rybox and talk to your doctor immediately (see What you need to know before you take Rybox section 2):

- shortness of breath, chest pains, or ankle swelling appear or if they get worse
- yellowing of the skin and eyes (jaundice) – these are signs of liver problems
- severe or continual stomach pain or your stools become black
- an allergic reaction- which can include skin problems such as ulcers or blistering, or swelling of the face, lips, tongue, or throat which may cause difficulty in breathing

The frequency of possible side effects listed below is defined using the following convention:

Very common (affects more than 1 user in 10)

Common (affects 1 to 10 users in 100)

Uncommon (affects 1 to 10 users in 1,000)

Rare (affects 1 to 10 users in 10,000)

Very rare (affects less than 1 user in 10,000)

The following side effects can occur during treatment with Rybox:

Very Common:

- stomach pain

Common:

- dry socket (inflammation and pain after a tooth extraction)
- swelling of the legs and/or feet due to fluid retention (oedema)
- dizziness, headache
- palpitations (fast or irregular heartbeat), irregular heart rhythm (arrhythmia)
- increased blood pressure
- wheezing or shortness of breath (bronchospasms)
- constipation, wind (excessive gas), gastritis (inflammation of the lining of the stomach), heartburn, diarrhoea, indigestion (dyspepsia)/stomach discomfort, nausea, being sick (vomiting), inflammation of the oesophagus, mouth ulcers
- changes in blood tests related to your liver
- bruising
- weakness and fatigue, flu-like illness

Uncommon:

- gastroenteritis (inflammation of the gastrointestinal tract that involves both the stomach and small intestine/stomach flu), upper respiratory infection, urinary tract infection