

If you forget to take Vanguard CCB Plus

If you forget to take a dose of this medicine, take it as soon as you remember and then take the next dose at its usual time. If it is almost time for your next dose you should simply take the next tablet at the usual time. **Do not** take a double dose (two tablets at once) to make up for a forgotten tablet.

If you stop taking Vanguard CCB Plus

Stopping your treatment with Vanguard CCB Plus may cause your disease to get worse. Do not stop taking your medicine unless your doctor tells you to.

Always take this medicine, even if you are feeling well

People who have high blood pressure often do not notice any signs of the problem. Many feel normal. It is very important that you take this medicine exactly as your doctor tells you to get the best results and reduce the risk of side effects. Keep your appointments with the doctor even if you are feeling well.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

As for any combination containing three active substances, side effects associated with each individual component cannot be excluded. The side effects reported with Vanguard CCB Plus or one of its three active substances (amlodipine, valsartan and hydrochlorothiazide) are listed below and may occur with the use of Vanguard CCB Plus.

Some side effects can be serious and need immediate medical attention. Consult a doctor immediately if you experience any of the following serious side effects after taking this medicine:

Common (may affect up to 1 in 10 people):

- dizziness
- low blood pressure (feeling of faintness, light-headedness, sudden loss of consciousness)

Uncommon (may affect up to 1 in 100 people):

- severely decreased urine output (decreased kidney function)

Rare (may affect up to 1 in 1,000 people):

- spontaneous bleeding
- irregular heart beat
- liver disorder

Very rare (may affect up to 1 in 10,000 people):

- sudden wheeziness, chest pain, shortness of breath or difficulty breathing
- swelling of eyelids, face or lips
- swelling of the tongue and throat which causes great difficulty breathing
- severe skin reactions including intense skin rash, hives, reddening of the skin over your whole body, severe itching, blistering, peeling and swelling of the skin, inflammation of the mucous membranes (Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis) or other allergic reactions
- heart attack
- inflamed pancreas, which may cause severe abdominal and back pain accompanied with feeling of being very unwell
- weakness, bruising, fever and frequent infections
- stiffness
- acute respiratory distress (signs include severe respiratory distress, fever, weakness and confusion).

Other side effects may include:

Very common (may affect more than 1 in 10 people):

- low level of potassium in the blood
- increase of lipids in the blood

Common (may affect up to 1 in 10 people):

- sleepiness
- palpitations (awareness of your heart beat)
- flushing
- ankle swelling (oedema)
- abdominal pain
- stomach discomfort after meal
- tiredness
- headache
- frequent urination
- high level of uric acid in the blood
- low level of magnesium in the blood
- low level of sodium in the blood
- dizziness, fainting on standing up
- reduced appetite
- nausea and vomiting
- itchy rash and other types of rash
- inability to achieve or maintain erection

Uncommon (may affect up to 1 in 100 people):

- fast heart beat
- spinning sensation
- vision disorder
- stomach discomfort
- chest pain
- increase of urea nitrogen, creatinine and uric acid in the blood
- high level of calcium, fat or sodium in the blood
- decrease of potassium in the blood
- breath odour
- diarrhoea
- dry mouth
- weight increase
- loss of appetite
- disturbed sense of taste
- back pain
- joint swelling
- muscle cramps/weakness/pain
- pain in extremity
- inability to either stand or walk in a normal manner
- weakness
- abnormal coordination
- dizziness on standing up or after exercising
- lack of energy
- sleep disturbances
- tingling or numbness
- trembling
- mood changes
- anxiety
- depression
- sleeplessness
- taste abnormalities
- fainting
- loss of pain sensation
- visual disturbances
- visual impairment
- ringing in the ears
- sneezing/runny nose caused by inflammation of the lining of the nose (rhinitis)
- altered bowel habits
- indigestion
- hair loss
- itchy skin
- skin discolouration
- disorder in passing urine
- increased need to urinate at night

- increased number of times of passing urine
- discomfort or enlargement of the breasts in men
- pain
- feeling unwell
- weight decrease

Rare (may affect up to 1 in 1,000 people):

- low level of blood platelets (sometimes with bleeding or bruising underneath the skin)
- sugar in the urine
- high level of sugar in the blood
- worsening of the diabetic metabolic state
- abdominal discomfort
- constipation
- liver disorders which can occur together with yellow skin and eyes, or dark-coloured urine (haemolytic anaemia)
- increased sensitivity of skin to sun
- purple skin patches
- kidney disorders
- confusion

Very rare (may affect up to 1 in 10,000 people):

- decreased number of white blood cells
- decrease in blood platelets which may result in unusual bruising or easy bleeding (red blood cell damage)
- swelling of the gums
- abdominal bloating (gastritis)
- inflammation of the liver (hepatitis)
- yellowing of the skin (jaundice)
- liver enzyme increase which may have an effect on some medical tests
- increased muscle tension
- inflammation of blood vessels often with skin rash
- sensitivity to light
- disorders combining rigidity, tremor and/or movement disorders
- fever, sore throat or mouth ulcers, more frequent infections (lack or low level of white blood cells)
- pale skin, tiredness, breathlessness, dark-coloured urine (haemolytic anaemia, abnormal breakdown of red blood cells either in the blood vessels or elsewhere in the body)
- confusion, tiredness, muscle twitching and spasm, rapid breathing (hypochloraemic alkalosis)
- severe upper stomach ache (inflammation of the pancreas)
- difficulty breathing with fever, coughing, wheezing, breathlessness (respiratory distress, pulmonary oedema, pneumonitis)
- inflammation of blood vessels with symptoms such as rash, purplish-red spots, fever (vasculitis)
- severe skin disease that causes rash, red skin, blistering of the lips, eyes or mouth, skin peeling, fever (toxic epidermal necrolysis)
- intestinal angioedema: a swelling in the gut presenting with symptoms like abdominal pain, nausea, vomiting and diarrhoea

Not known (frequency cannot be estimated from the available data):

- changes in blood tests for kidney function, increase of potassium in your blood,
- low level of red blood cells
- abnormal red blood cell test
- low level of a certain type of white blood cell and blood platelet
- increase of creatinine in the blood
- abnormal liver function test
- severely decreased urine output
- inflammation of blood vessels
- weakness, bruising and frequent infections (aplastic anaemia)
- decrease in vision or pain in your eyes due to high pressure (possible signs of fluid accumulation in the vascular layer of the eye (choroidal effusion) or acute angle-closure glaucoma)
- breathlessness
- severely decreased urine output (possible signs of renal disorder or renal failure)
- severe skin disease that causes rash, red skin, blistering of the lips, eyes or mouth, skin peeling, fever (erythema multiforme)
- muscle spasm
- fever (pyrexia)

- أدوية تستخدم لعلاج المرض (أدوية تُمكن المرضى من الخضوع للجراحة وغيرها من الإجراءات).
- ألماتحادين (دواء يُستخدم لعلاج مرض بركسون، ويُستخدم أيضاً لعلاج بعض الأمراض المحددة التي تسببها الفيروسات أو الوفاية منها).
- الأدوية المضادة للكولين (الأدوية المستخدمة لعلاج إضطرابات مختلفة مثل: تقلصات الجهاز الهضمي، ونشجات المثانة البولية، والربو، ومرض دوار البحر، وتشنج العضلات، ومرض بركسون (شلل الرعاش) والمستخدمه كأدوية مساعدة في عملية التخدير).
- الأدوية المضادة للتشنجات، والأدوية المثبتة للمزاج المستخدمة لعلاج الصرع والاضطراب الثنائي القطب (مثل: كاربامازيبين، أو فينوباريتال، أو فينيتوين، أو فوسفينويتون، أو برعيدون).
- الكوليسترامين أو الكوليستيول أو الارتجات الأخرى (أدوية تُستخدم في الأساس لعلاج ارتفاع مستويات الدهون في الدم).
- سيكوساتين (دواء يُستخدم لضبط مستويات الكوليسترول المرتفعة).
- سيفكسامين (دواء يُستخدم عند نقل الأعضاء، لمنع رفض الجسم للعضو المزروع، أو للحالات الأخرى مثل: التهاب المفاصل الروماتويدي، أو التهاب الجلد التأتبي).
- الأدوية السامة للخلايا (التي تُستخدم لعلاج السرطان) مثل: ميتوريكسات أو سيكلوفوسفاميد.
- الديوكسين أو الأنواع الأخرى من هليكويزيدات الديجيتاليس (أدوية تُستخدم لعلاج مشكلات القلب)، فيراباسيل وديلتيازيم (أدوية قلب).
- وسائط التباين المشتملة على اليود (مواد تُستخدم في الفحوصات بالتصوير).
- الأدوية المستخدمة لعلاج السكري (الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم مثل: الميتفورمين، أو الإنسولين، أدوية علاج التقرس، مثل أوبيريونول.
- أدوية التي قد ترفع مستويات السكر في الدم (مثل حصرات بيتا، ديازوكسيد)
- أدوية التي قد تسبب في حدوث "خربات قلب غير منتظمة"، مثل: مضادات اضطرابات النظم (أدوية تُستخدم لعلاج مشاكل القلب) وبعض مضادات الأبحاث.
- أدوية التي قد تقلل كمية الصوديوم في الدم، مثل: مضادات الاكتئاب ومضادات الأُدهان وأدوية الصرع.
- الأدوية التي تقلل كمية البوتاسيوم في الدم، مثل: مُدرات البول (أقراص المياه) أو الكورتيكوستيرويدات أو المُثَبِّات أو أمفوتيريسين أو بنسبلن ج.
- أدوية التي رفع ضغط الدم، مثل: الأدرينالين أو النورأدرينالين.

- أدوية المستخدمة لعلاج فيروس الحوز المناعي البشري/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (مثل، ريتونافير، أو إندينافير، أو نيلفينافير).

- أدوية المستخدمة لعلاج العدوى الفطرية (مثل: كيتوكونازول، أو إتراكونازول.
- أدوية المستخدمة لعلاج الفُرح والتهاب المريء، (كاربينوكسولون).
- أدوية المستخدمة لتسكين الألم أو تخفيف التهاب خاصة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، وتشمل مسيلات أنزيمات الأكسدة الحلقية ٢ الانتقائية (مسيلات 2-Cox).
- أدوية الباسطة للعضلات (أدوية لإرخاء العضلات تُستخدم خلال العمليات).
- التيروغليسرين والتترات الأخرى أو المواد الأخرى المعروفة باسم "المواد المؤسّعة للأوعية الدموية".
- أدوية الأخرى المُستخدمه لعلاج ارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك ميتيل دوبا.
- ريفايسين (يُستخدم لعلاج مرض السل على سبيل المثال)، وواريفيروميسين، وكلاريفروميسين (مضادات حيوية).
- نبته سانت جونز.
- أدوتروين (مستخلص طبي لعلاج حالات الخلل الشديد في درجة حرارة الجسم).
- فيتامين د، وأملاح الكالسيوم.

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store Vanguard CCB Plus

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton and blister after EXP. The expiry date refers to the last day of that month.

Do not store above 30°C.

Store in the original package in order to protect from moisture.

Do not use any Vanguard CCB Plus pack that is damaged or shows signs of tampering. Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

أخرى طبيبك إذا كنت تضعين أو على وشك بدء الإضراب: مرور ثوب الأمولوديين بكميات صغيرة إلى حليب الأم. لا يُنصح باستعمال فاندجر سي سي في بلس من قبل الأمهات أثناء فترة الإرضاع. وقد يختار طبيبك علاجاً آخر إذا كنت ترغبين في الإرضاع، وخاصةً إذا كان طفلك حديث الولادة أو مولوداً قبل أوانه.

استشرى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

القيادة وتشغيل الآلات
قد يصيبك هذا الدواء بالدوار أو النعاس أو الغثيان، وقد يسيب لك الصعاج. إذا أصبت بأَيٍّ من هذه الأعراض، فامتنع عن قيادة السيارة أو استخدام الأدوات أو الآلات.

Vanguard CCB Plus is available in packs containing 28 tablets (7’s Blister x 4).

Not all pack sizes may be marketed.

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer
Laboratorios Cinfa, S.A.
Olaz-Chipi, 10. Poligono Industrial Areta
31620 Huarte (Navarra) - Spain

This leaflet was last revised in February 2025.

This is a Medicament
- Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you. - Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. - The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks. - Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you. - Do not repeat the same prescription without consulting your doctor. - Keep all medicaments out of reach of children.
Council of Arab Health Ministers Union of Arab Pharmacists

إذا نسيبت تناول **فاندجر سي سي في بلس**

إذا نسيبت جرعة من هذا الدواء، فتناولها بمجرد تدركُك ثم تناول الجرعة التالية في موعدها المعتاد. إذا

أقرب موعد تناول الجرعة التالية، فتناول الجرعة التالية في موعدها المعتاد. لا تتناول جرعة مضاعفة (فرضين في الوقت نفسه) لتعويض الجرعة التي نسيبتها.

إذا توقفت من تناول **فاندجر سي سي في بلس**
قد يتسبب التوقف عن العلاج بأقراص فاندجر سي سي في بلس في زيادة حدة المرض. لا تتوقف عن تناول الدواء حتى يخبرك الطبيب بذلك.

النشرة الداخلية: معلومات للمريض

فاندجارد سي سي بي بلس ١٠ ملجم/ ١٦٠ ملجم/ ١٢,٥ ملجم

أقراص مغلفة

أملوديبين / فالسرتان/هيدروكلوروثيازيد

اقرأ هذه النشرة الدوائية بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء؛ لأنها تحتوي على معلومات هتمك.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى فاسأل الطبيب أو الصيدلي.
- وُصف هذا الدواء من أجلك فقط، فلا تعطه لغيرك؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بهم، حتى و إن كانت أعراضهم المرضية مشابهة لما تشعر به.
- إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية فاستشر الطبيب أو الصيدلي ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. انظر القسم ٤

- محتويات هذه النشرة**
- ما هو فاندجر سي سي بي بلس وماهي دواعي استعماله
 - ما يجب معرفته قبل تناول فاندجر سي سي بي بلس
 - الجرعة وطريقة استخدام فاندجر سي سي بي بلس
 - الآثار الجانبية المحتملة
 - كيفية تخزين فاندجر سي سي بي بلس
 - محتويات العلبة ومعلومات أخرى

١- **ما هو فاندجر سي سي بي بلس وماهي دواعي استعماله**
تحتوي أقراص فاندجر سي سي بي بلس على ثلاث مواد فعالة وهي أملوديبين، وفالسرتان، وهيدروكلوروثيازيد. تساعد كل هذه المواد في التحكم في مستوى ضغط الدم المرتفع.
• تنتمي مادة أملوديبين إلى مجموعة من المواد المعروفة بـ"محصرات قنوات الكالسيوم". يمنع أملوديبين الكالسيوم من الانتقال عبر جدار الأوعية الدموية مما يمنع الأوعية الدموية من التضيق.
• ينتمي فالسرتان إلى مجموعة من المواد التي تُعرف بـ "مضادات مستقبلات الأنجيوتنسين الثاني". يُنتج الجسم الأنجيوتنسين الثاني بشكل طبيعي ويؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية ومن ثم زيادة ضغط الدم. يعمل فالسرتان من خلال تثبيط مفعول الأنجيوتنسين الثاني.
• ينتمي الهيدروكلوروثيازيد إلى مجموعة من المواد تُعرف بـ "مدرات البول الثيازيدية".

ويعمل هيدروكلوروثيازيد على زيادة إنتاج البول مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم.
ونتيجة لنشاط هذه الآليات الثلاثة معاً، ترتخي الأوعية الدموية وينخفض مستوى ضغط الدم.
يُستخدم فاندجر سي سي بي بلس لعلاج ارتفاع ضغط الدم لدى المرضى البالغين الذين يتحكمون في ضغط الدم من خلال تناول أملوديبين وفالسرتان وهيدروكلوروثيازيد، والذين سينتفعون من تناول هذه المواد الثلاثة معاً في قرص واحد.

يستخدم فاندجر سي سي بي بلس لعلاج ارتفاع ضغط الدم لدى المرضى البالغين الذين يتحكمون في ضغط الدم من خلال تناول أملوديبين وفالسرتان وهيدروكلوروثيازيد، والذين سينتفعون من تناول هذه المواد الثلاثة معاً في قرص واحد.

- ٢- **ما يجب معرفته قبل تناول فاندجر سي سي بي بلس**
لا تتناول فاندجر سي سي بي بلس في الحالات التالية
• إذا تجاوزت فترة الحمل ثلاثة أشهر (يُنصح أيضاً بتجنب فاندجر سي سي بي بلس في المرحلة الأولى للحمل - انظر قسم الحمل).
- إذا كنت تعاني من حساسية بأداة أملوديبين أو أي من محصرات قنوات الكالسيوم، أو فالسرتان، أو هيدروكلوروثيازيد، أو الأدوية المشتقة من السلفوناميد (الأدوية المستخدمة لعلاج عدوى الصدر أو الجهاز البولي)، أو أيٍّ من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المدرجة في القسم ٦).
- إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالحساسية، فلا تتناول فاندجر سي سي بي بلس، واستشر طبيبك.
- إذا كنت تعاني من مرض كبدي مع تلف في القنوات الصفراوية الصغيرة في الكبد (تليف صفراوي)، والذي يؤدي إلى تراكم الصفراء في الكبد (رُكود صفراوي).
- إذا كنت تعاني من مرض خطير في الكلى أو إذا كنت تخضع لجلسات الغسيل الكلوي.
- إذا فقدت القدرة على إدراج البول (انقطاع البول).
- إذا كان مستوى البوتاسيوم أو الصوديوم في دمك شديد الانخفاض رغم خضوعك للعلاج لزيادة مستويات البوتاسيوم أو الصوديوم في الدم.
- إذا كان مستوى البوتاسيوم أو الصوديوم في دمك شديد الارتفاع رغم خضوعك للعلاج لخفض مستويات البوتاسيوم أو الصوديوم في الدم.
- إذا كنت مصاباً بالقرس (بثورات حمض اليوريك في المفاصل).
- إذا كنت تعاني من انخفاض شديد في ضغط الدم.
- إذا كنت تعاني ضيقاً في صمام الشريان الأورطي، أو معرضاً للإصابة بصدمة قلبية (التي تحدث عندما يكون القلب غير قادر على إيصال كميات كافية من الدم إلى الجسم).
- إذا كنت تعاني من قصور في القلب نتيجة الإصابة بأزمة قلبية.
- إذا كنت مصاباً بمرض السكري أو اعتلال في وظائف الكلى وتعالُج بدواء مخفض لضغط الدم يحتوي على مادة الأسكرينسين.

إذا انطبقت عليك أيُّ من الحالات السابقة، فلا تتناول فاندجر سي سي بي بلس واستشر الطبيب.

التحذيرات والاحتياطات
تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول فاندجر سي سي بي بلس:
• إذا كان مستوى البوتاسيوم أو المنيسيوم في الدم منخفضاً (في حالة ظهور أعراض مثل ضعف العضلات، وتشنجات العضلات، وعدم انتظام ضربات القلب، أو في حالة عدم ظهور أعراض).
• إذا كان مستوى الصوديوم في الدم منخفضاً (في حالة ظهور أعراض مثل: الشعور بالإرهاق، والإرتباك، وتعاثر العضلات، والاختلاجات، أو في حالة عدم ظهور أعراض).
• إذا كان مستوى الكالسيوم في دمك مرتفعاً (في حالة ظهور أعراض مثل: الغثيان، والقيء، والإسماك، وآلم بالمعدة، والتبول المتكرر، والغثطش، وضعف وتعاثر في العضلات، أو في حالة عدم ظهور أعراض).
• إذا كنت تعاني من مشكلات بالكلى، أو خضعت لعملية زراعة كلية، أو أخبرت أنك تعاني تضيقاً في الشرايين الكلوية.

- إذا كنت تعاني من مشكلات في الكبد.
- إذا كنت تعاني من قصور في القلب، أو مرض الشريان التاجي، خاصة إذا وُصفت لك أكبر جرعة من فاندجر سي سي بي بلس (١٠ ملجم/ ٢٢٠ ملجم/ ٢٥ ملجم).
- إذا أصبت من قبل بأزمة قلبية، التبع لإرشادات الطبيب الخاصة بالجرعة الأولى بعناية. قد يفحص طبيبك أيضاً وظائف الكلى.
- إذا أجورك طبيبك أثناء مصاب بتضيق في صمامات القلب (حالة تُعرف باسم "تضيق الصمام الأبهري أو تضيق الصمام الميترالي") أو بزيادة ثخانة غشلة القلب (حالة تُعرف باسم اعتلال غشلة القلب الضخامي الاستسادي).

- إذا كنت تعاني من فرط الأندوستيرونية، وهو مرض نادر فيه الغدد الكظرية كميات هائلة من الألدوستيرون، إذا كان هذا هو الحال معك، فلا يُنصح باستخدام فاندجر سي سي بي بلس.
- إذا كنت تعاني من المرض المعروف باسم مرض الذئبة الحمامية الجهازية (تطلق عليه أيضاً اسم "مرض الذئبة" أو اختصار "SLE".
- إذا كنت مصاباً بمرض السكري (ارتفاع مستوى السكر في الدم).
- إذا كنت مصاباً بارتفاع مستويات الكوليسترول أو ثلاثي الجليسريدات في الدم.
- إذا كنت تعاني من تفاعلات بالجِلد مثل الطفح الجلدي بعد التعرض للشمس.
- إذا أصبت بتفاعل تحسسي تجاه أدوية علاج ضغط الدم الأخرى، أو مُدرات البول (نوع من الأدوية يُعرف أيضاً باسم "أقراص الماء"، خاصة إذا كنت مصاباً بالربو والحساسية).

- إذا كنت تشعر بأعراض (قيء أو إسهال).
- إذا كنت قد أصبت مسبقاً بتورم، وخاصة في الوجه والحقن، أثناء تناول أدوية أخرى (ما في ذلك مسطحات الأازينيم لمحول للأنجيوتنسين). إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، فتوقف عن تناول فاندجر سي سي بي بلس واتصل بطبيبك على الفور. يجب ألا تتناول فاندجر سي سي بي بلس مطلقاً.
- إذا أصبت بالدوار أو الإغماء خلال العلاج فاندجر سي سي بي بلس، فأخبر طبيبك في أقرب وقت ممكن.
- إذا شعرت بضعف في الرقبة أو آ في العين، قد تكون هذه الحالات أعراضاً ل تراكم السائل داخل الغشاء الوعائي للعين (الارتفاع القرني) أو لارتفاع ضغط العين وقد يحدث ذلك خلال ساعات إلى أسابيع من تناول فاندجر سي سي بي بلس، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان حاسة البصر بشكل دائم، في حال عدم علاج.
- إذا كنت تتناول الأدوية التالية لعلاج ضغط الدم المرتفع:
 - دواء مثبط للأزيميم لمحول للأنجيوتنسين (مثل: ألتابريل، أو ليزينوبريل، أو راميبريل، وخاصة إذا كنت تعاني من مشكلات في الكلية مرتبطة بمرض السكري.
 - الأسكرينين.

- إذا أصبت من قبل بسرطان الجلد أو إذا ظهرت لديك فجأة آفات جلدية أثناء العلاج، قد يؤدي العلاج بمادة هيدروكلوروثيازيد، خاصةً استخدام على المدى الطويل بجرعات عالية، إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان الجلد والشفاه (سرطان الجلد غير الميلاني)، قم بحماية جلدك من التعرض للشمس ومن الأشعة فوق البنفسجية أثناء استخدام علاج فاندجر سي سي بي بلس.
- إذا عانيت من مشاكل في التنفس أو الرئة (مثل انتفاخ أو سوائل في الرئتين) بعد تناول هيدروكلوروثيازيد في الماضي، إذا أصبت بصعوبة في التنفس أو ضيق شديد في التنفس بعد تناول أملوديبين / فالسرتان / هيدروكلوروثيازيد، فاستشر طبيبك على الفور.

استشر طبيبك إذا شُرت بآم في البطن، أو غثيان، أو قيء، أو إسهال بعد تناول أملوديبين/فالسرتان/هيدروكلوروثيازيد. سيقوم طبيبك بأخذ قرار بشأن العلاج، لا تتوقف عن تناول أملوديبين/فالسرتان/هيدروكلوروثيازيد من تلقاء نفسك.

قد يفحص طبيبك ووظائف الكلى وضغط الدم وكمية الإلكتروليتات (مثل البوتاسيوم) في الدم لديك على فترات زمنية منتظمة.

انظر أيضاً لمعلومات الولادة تحت عنوان "لا تتناول دواء فاندجر سي سي بي بلس".

إذا انطبقت عليك أيُّ من الحالات السابقة، فاستشر الطبيب.

الأطفال والمراهقون

لا يُنصح باستخدام فاندجر سي سي بي بلس من قبل المراهقين دون ١٨ عاماً.

كبار السن (٦٥ عاماً فأكثر)

يمكن للأشخاص في سن ٦٥ عاماً فأكثر تناول فاندجر سي سي بي بلس بنفس الجرعة الموصوفة للبالغين الآخرين بنفس الطريقة نظرًا لأنهم قد تناولوا من قبل المواد الثلاثة: الأملوديبين، والفالسرتان، والهيدروكلوروثيازيد. يجب على المرضى كبار السن، خاصةً من يتناولون الجرعة الأكبر من أملوديبين /

