

Ziquin® 500 mg film-coated tablets

levofloxacin

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

What is in this leaflet

- What Ziquin tablets is and what it is used for
- What you need to know before you take Ziquin tablets
- How to take Ziquin tablets
- Possible side effects
- How to store Ziquin tablets
- Contents of the pack and other information

1. What Ziquin tablets is and what it is used for

The name of this medicine is Ziquin film-coated tablets. Ziquin tablets contain an active ingredient called levofloxacin, which belongs to the group of medicines called antibiotics. Levofloxacin is a quinolone antibiotic and it works by killing bacteria that cause infections in your body.

Antibiotics are used to treat bacterial infections. They are not effective in the treatment of viral infections, such as flu or colds. Please follow your doctor's instructions carefully with regard to dose, administration interval and duration of treatment. Do not keep or reuse this medicine. If you have any antibiotics remaining at the end of your course of treatment, please return them to your pharmacist for proper disposal. Do not dispose of any medicines via wastewater or household waste.

Ziquin tablets can be used to treat infections in:

- the paranasal sinuses
- the lungs, in people with long-term breathing problems or pneumonia
- the urinary tract, including the kidneys or bladder
- the prostate, when the infection is persistent
- the skin and under the skin, including the muscles. This is sometimes referred to as "soft tissues".

In some special situations, Ziquin tablets can be used to reduce the possibility of acquiring a lung infection called anthrax or a worsening of the disease after you have been exposed to the bacterium that causes anthrax.

2. What you need to know before you start taking Ziquin tablets

Do not take this medicine and consult your doctor

- if you are allergic to levofloxacin, other quinolone antibiotics such as moxifloxacin, ciprofloxacin or ofloxacin or to any of the other ingredients of this medicine (see section 6)
- if the signs of an allergic reaction include: skin rash, difficulty breathing or swallowing, swollen lips, face, throat or tongue
- if you suffer or have suffered from epilepsy
- if you have ever suffered tendon problems, such as tendinitis, which were related to treatment with quinolone antibiotics. The tendon is the tissue that attaches your muscle to your skeleton
- if you are a growing child or adolescent
- if you are pregnant, might fall pregnant or think you might be pregnant
- if you are breastfeeding.

Do not take this medicine if you are affected by any of the cases described above. Before taking Ziquin, check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Warnings and precautions

Talk to your doctor or pharmacist before using this medicine if:

- You are 60 years old or older
- You are using corticosteroids, sometimes called steroids (see section "Other medicines and Ziquin")
- You have received a transplant
- You have ever had an epileptic fit (seizures)
- You have suffered brain damage due to a stroke or other brain injury
- You have kidney problems
- You have what is known as "glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency", as you may be prone to having serious blood problems when taking this medicine
- You have ever had mental health problems
- You have ever had heart problems: caution should be exercised when using this type of medicine. If you were born with, or have a family history of prolongation of the QT interval (seen in an electrocardiogram (ECG), graphical representation of the electrical activity of the heart), you have an imbalance in your blood salt levels (especially a low level of potassium or magnesium in your blood), you have a slow heart rate (also known as "bradycardia"), you have a weak heart (heart failure), you have a history of heart attack (myocardial infarction), if you are a woman or an elderly person or are taking other medications that may cause abnormal changes in the ECG (see section "Other medicines and Ziquin")
- You are diabetic
- You have ever had liver problems
- You suffer from myasthenia gravis
- You suffer peripheral nerve disorders (peripheral neuropathy)
- If you have been diagnosed with an enlargement or "bulge" in a large blood vessel (aortic aneurysm or aneurysm of a large peripheral vessel)
- If you have had a previous episode of aortic dissection (tear in the wall of the aorta)

- If you have a family history of aortic aneurysm or aortic dissection or other risk factors or predisposing disorders (e.g. connective tissue disorders like Marfan syndrome or Ehlers-Danlos syndrome, or vascular disorders like Takayasu's arteritis, giant cell arteritis, Behçet's disease, arterial hypertension or known atherosclerosis).
- You have ever developed a severe skin rash or flaking skin, blisters and/or sores in the mouth after taking levofloxacin.

Severe cutaneous reactions

Severe cutaneous reactions including Stevens–Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis (NET) and drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) have been reported with the use of levofloxacin.

- SJS/NET can initially appear on the trunk as red target-like spots or circular patches often with blisters in the middle. Ulcers can also appear in the mouth, throat, nose, genitals and eyes (red, puffy eyes). These severe skin rashes are often preceded by fever and/or flu-like symptoms. The rash can progress to generalised flaking of the skin and life-threatening or fatal complications.
- DRESS initially presents with flu-like symptoms and a rash on the face, followed by a more extensive rash with a high temperature, elevated levels of liver enzymes in blood tests and an increase in a certain type of white blood cells (eosinophils) and enlarged lymph nodes.

If you develop a severe rash or any of these skin symptoms, stop taking levofloxacin and contact your doctor or seek medical attention immediately.

You should not take antibacterial medicines containing fluoroquinolones, or quinolones, including Ziquin, if you have previously experienced any serious adverse reaction when taking a quinolone or fluoroquinolone. If you have, you must inform your doctor as soon as possible.

Talk to your doctor, nurse or pharmacist when you are taking your medicine:

- If you feel sudden, severe pain in your abdomen, chest or back which can be symptoms of aortic aneurysm and dissection, go immediately to an emergency room. Your risk may be increased if you are being treated with systemic corticosteroids.
- If you start experiencing a rapid onset of shortness of breath, especially when you lie down flat in your bed, or you notice swelling of your ankles, feet or abdomen, or a new onset of heart palpitations (sensation of rapid or irregular heartbeat), you should inform your doctor immediately.

- الكيمية الواجب تناولها**
- سيفرر طبيبك عدد أقراص زيكوين التي يجب عليك تناولها.
- ستستخدم الجرعة على نوع العدوى والمكان المصاب بالعدوى داخل جسمك.
- ستستخدم مدة العلاج على مدى خطورة العدوى.
- في حال الشعور بأن تأثير الدواء ضعيف جداً أو قوي جداً، لا تغير الجرعة من تلقاء نفسك، ولكن استشر طبيبك.

- البالغون وكبار السن**
- عدوى الجيوب الأنفية**
- قرص واحد من زيكوين ٥٠٠ ملجم، مرة واحدة يومياً.

- عدوى الرئتين، لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات طويلة الأمد في التنفس**
- قرص واحد من زيكوين ٥٠٠ ملجم، مرة واحدة يومياً.

- الالتهاب الرئوي**
- قرص واحد من زيكوين ٥٠٠ ملجم، مرة واحدة أو مرتين يومياً.

- عدوى الجهاز البولي، ويشمل الكلتيين أو المثانة البولية**
- نصف قرص أو قرص واحد من زيكوين ٥٠٠ ملجم، مرة واحدة يومياً.

- عدوى غدة البروستاتا**
- قرص واحد من زيكوين ٥٠٠ ملجم، مرة واحدة يومياً.

- عدوى الجلد وما تحت الجلد، بما في ذلك العضلات**
- قرص واحد من زيكوين ٥٠٠ ملجم، مرة واحدة أو مرتين يومياً.

- البالغون وكبار السن المصابون بمشاكل في الكلى**
- قد يحتاج طبيبك إلى إعطائك جرعة أقل.

- الأطفال والمراهقون**
- يجب عدم إعطاء هذا الدواء للأطفال والمراهقين.

- حماية البشرة من أشعة الشمس**
- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة العلاج بهذا الدواء ولمدة يومين بعد التوقف عن تناول الدواء، وذلك لأن بشرتك ستصبح أكثر حساسية للشمس وربما تصاب بالحرق أو الوخز أو البثور المتقشرة إذا لم تتخذ الاحتياطات التالية:
- تأكد من استخدام كريم وقاية من الشمس ذي عامل حماية عالٍ.
- رتدِ ملابس قبيحة وملابس تغطي الذراعين والساقين.
- تجنب مصابيح الأشعة فوق البنفسجية.

- ما يجب عليك القيام به عند تناول جرعة زائدة من أقراص زيكوين**
- في حال تناول العديد من الأقراص عن طريق الخطأ اتصل بطبيبك أو احصل على استشارة طبية أخرى على الفور. واصلتصّب معك عبلة الدواء؛ وذلك لكي يعرف الطبيب ماذا تناولت. قد تحدث الأعراض التالية: نوبات تشنّج (نوبات صرع)، الارتباك و اضطراب الوعي و الإدراك، الإصابة بالارتعاش ومشاكل في القلب - مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب بالإضافة إلى الشعور بالإعياء أو الإصابة بحرقة في المعدة.

- في حال نسيان تناول أقراص زيكوين**
- إذا كان نسيان تناول إحدى الجرعات، تناولها بمجرد تذكّر ذلك، إلا إذا اقرب موعد تناول الجرعة التالية، لا تتناول الجرعة التالية مضاعفة لتعويض الجرعة الفائتة.

- إذا توقفت عن تناول أقراص زيكوين**
- لا تتوقف عن تناول زيكوين لمجرد الشعور بتحسن. من المهم أن تكمل العلاج بالأقراص طوال المدة التي وصفها لك الطبيب. في حال التوقف عن تناول الأقراص بعد وقت قصير، قد تعادول الإصابة بالعدوى وربما تزداد حالتك سوءاً أو قد تصبح البكتيريا مقاومة للدواء.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى عن طريقة استخدام هذا الدواء فاسأل الطبيب أو الصيدلي.

٤- الآثار الجانبية المحتملة مثل كل الأدوية، قد يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، ولكنها لا تظهر بالضرورة على كل من يتناوله، عادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة أو متوسطة وغالباً ما تختفي بعد وقت قصير. توقف عن تناول زيكوين واستشر طبيباً أو توجه إلى أقرب مستشفى على الفور إذا لاحظت ظهور الأعراض الجانبية التالية:
نادرة جداً (قد تصيب شخصاً واحداً من كل ١٠,٠٠٠ شخص) تفاعلات حساسية، وتشمل العلامات التالية: طفح جلدي أو مشاكل في التنفس أو البلع أو تورم الشفاه أو الوجه أو الحلق أو اللسان.
توقف عن تناول زيكوين وتوجه إلى الطبيب مباشرة إذا لاحظت ظهور أي من الأعراض الجانبية الخطيرة التالية - فرها تحتاج إلى علاج عاجل:

- نادرة (قد تصيب شخصاً واحداً من بين ١٠٠٠ شخص)**
- إسهال شديد قد يكون مصحوباً ب نزول دم، ومن المحتمل أن يكون مصحوباً بتقلصات في المعدة وارتفاع في درجة الحرارة. قد تكون هذه الأعراض علامة على وجود مشكلة خطيرة في الأمعاء.
- آلم والتعب في الأوتار أو الأربطة، مما يؤدي إلى حدوث تمزق. يكون وتر العرقوب أكثر الأوتار عرضة للإصابة.
- نوبات صرع (تشنجات).
- رؤية أو سماع أشياء غير موجودة (الهالوس)، جنون الشك والارتباك).
- الشعور بالانكباب، مشاكل عقلية، الشعور بالتملص (التقيح)، آلام مزعجة أو كوابيس.
- طفح جلدي عام، ارتفاع في درجة الحرارة، ارتفاع مستوى إنزيمات الكبد، زيادة غير طبيعية في نوع من خلايا الدم (فرط الحمضات)، تضخم الغدد الليمفاوية وتفاعلات تحسسية مثل متلازمة فرط الحساسية (DRESS). انظر القسم ٣.
- المتلازمة المرتبطة باحتباس الماء وانخفاض مستويات الصوديوم (SIADH).
- انخفاض مستويات السكر في الدم (هبوط سكر الدم)، وهو أمر مهم بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري.

- نادرة جداً (قد تصيب شخصاً واحداً من كل ١٠,٠٠٠ شخص)**
- شعور بالحرقة أو الوخز أو الألم أو التخدیر. قد تكون هذه الأعراض علامات الإصابة بمرض يُسمى اعتلال الأعصاب".
- أعراض غير محددة المعدل (لا يمكن تقدير معدل تكرارها من البيانات المتاحة)
- طفح جلدي شديد، بما في ذلك متلازمة ستيفنز جونسون وانحلال البشرة السُمعي. مكن أن تظهر الأعراض في البداية على الجلد عجزاً حمراء تشبه الهدف أو بقع دائرية و غالباً يصاحبها ظهور بنور في المنتصف. يمكن أن تظهر القرحة أيضاً في الفم والحلق والأنف والأعضاء التناسلية والعينين، غالباً ما يسبق هذا الطفح الجلدي الشديد حمى و / أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا. انظر القسم ٣.
- فقدان الشهية، اصفرار الجلد والعينين، بول داكن اللون، حكة، آلم في البطن. قد تكون هذه الأعراض علامات على وجود مشاكل خطيرة في الكبد قد تشمل الفشل الكبدي.
- تغير في الآراء والأفكار (تفاعلات ذهانية) مع مخاطر أفكار أو أفعال انتحارية.
- غثيان، شعور عام بالتعب، وعدم الراحة أو آلم في منطقة المعدة، أو القيء. قد تكون هذه علامات التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس الحاد). انظر القسم ٣.

- نادرة جداً (قد تصيب شخصاً واحداً من كل ١٠,٠٠٠ شخص)**
- شعور بالحرقة أو الوخز أو الألم أو التخدیر. قد تكون هذه الأعراض علامات الإصابة بمرض يُسمى اعتلال الأعصاب".

- أعراض غير محددة المعدل (لا يمكن تقدير معدل تكرارها من البيانات المتاحة)**
- طفح جلدي شديد، بما في ذلك متلازمة ستيفنز جونسون وانحلال البشرة السُمعي. مكن أن تظهر الأعراض في البداية على الجلد عجزاً حمراء تشبه الهدف أو بقع دائرية و غالباً يصاحبها ظهور بنور في المنتصف. يمكن أن تظهر القرحة أيضاً في الفم والحلق والأنف والأعضاء التناسلية والعينين، غالباً ما يسبق هذا الطفح الجلدي الشديد حمى و / أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا. انظر القسم ٣.
- فقدان الشهية، اصفرار الجلد والعينين، بول داكن اللون، حكة، آلم في البطن. قد تكون هذه الأعراض علامات على وجود مشاكل خطيرة في الكبد قد تشمل الفشل الكبدي.
- تغير في الآراء والأفكار (تفاعلات ذهانية) مع مخاطر أفكار أو أفعال انتحارية.
- غثيان، شعور عام بالتعب، وعدم الراحة أو آلم في منطقة المعدة، أو القيء. قد تكون هذه علامات التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس الحاد). انظر القسم ٣.

- استشر أخصائي عيون على الفور في حالة اضطراب الرؤية أو إذا كنت تعاني من اضطرابات أخرى في العين أثناء تناول زيكوين.

- تناول المضادات الحيوية من مجموعة الفلوروكينولون أو الكينولون، قد يؤدي إلى حدوث آثار جانبية نادرة جداً قد تمتد لفترة طويلة (شهور أو أعوام) أو قد تكون دائمة، مثل التهاب وتمزق الأوتار، آلام المفاصل والأطراف، صعوبة في المشي، شعور غير طبيعي مثل الوخز والتنميل والحرقان، التعب، وضعف الذاكرة والتركيز، وآثار على الصحة العقلية (والتي قد تشمل اضطرابات النوم، والقلق، ونوبات البلع، والانكباب، والأفكار الانتحارية)، فضلاً عن ضعف السمع والبصر والتذوق والشم، في بعض الحالات بغض النظر عن وجود عوامل الخطورة مسبقاً.

- تضخم وضعف في الجدار الأورطي أو تمزق في الجدار الأورطي (تمدد الأوعية الدموية والتسلخ)، والتي قد تتمزق وقد تكون مهددة للحياة، وتسرب في صمامات القلب لدى المرضى الذين يتناولون الفلوروكينولون (انظر أيضًا القسم ٣).

أخير طبيبك إذا أصبح أي من الأعراض الجانبية التالية حاداً أو استمر لأكثر من بضعة أيام قليلة:

- شائعة** (قد تصيب شخصاً واحداً من كل ١٠ أشخاص)
- مشاكل في النوم.
- صداع، شعور بالدوار.
- شعور بالإعياء (غثيان، قيء) وإسهال.
- زيادة مستوى بعض إنزيمات الكبد في الدم.

غير شائعة (قد تصيب شخصاً واحداً من بين ١٠٠ شخص)

- تغيرات في أعداد البكتيريا أو الفطريات الأخرى، عدوى بنوع من الفطريات يعرف باسم المبيضات، والتي تحتاج إلى علاج.
- تغيرات في عدد كرات الدم البيضاء تظهر في نتائج بعض اختبارات الدم (قلة كريات الدم البيضاء، كثرة اليوزينيات).
- الشعور بالتوتر (القلق)، الاضطراب، العصبية، الشعور بالتعب، الارتعاش، الدوخة (الدوار).
- ضيق التنفس (صعوبة التنفس).
- تغيرات في مذاق الأشياء، فقدان الشهية، اضطراب في المعدة أو عسر هضم، آلم في منطقة البطن، الشعور بالانتفاخ (امتلاء البطن بالغازات)، الإمساك.
- الحكة والطفح الجلدي، الحكة الشديدة أو الحشرى (وتكرارياً)، فرط الحرق (زيادة في إفراز العرق)، آلم في المفاصل أو آلم في العضلات.
- قد تظهر اختبارات الدم نتائج غير طبيعية نتيجة لحدوث مشاكل في الكبد (زيادة في نسبة البيليروبين) أو الكلى (زيادة في نسبة الكرياتينين).
- ضعف عام.

- نادرة (قد تصيب شخصاً واحداً من بين ١٠٠٠ شخص)**
- الإصابة بكدومات وتوقف بسهولة نتيجة انخفاض عدد الصفائح الدموية.
- انخفاض عدد كرات الدم البيضاء.
- فرط الاستجابة المناعية (فرط الحساسية).
- شعور بالخويز في اليدين والقدمين (المُذل).
- مشاكل في السمع (طنين) أو الرؤية (رؤية ضبابية).
- ضربات قلب سريعة غير منتظمة أو انخفاض ضغط الدم.
- ضعف في العضلات، وهو أمر مهم بالنسبة للأشخاص المصابين بالوهن العضلي الوبيل (مرض نادر يصيب الجهاز العصبي).
- اضطرابات في وظائف الكلى وفشل كلوي عرضي قد يكون نتيجة لحدوث تفاعل حساسية في الكلية يعرف باسم التهاب الكلية الخلالي.
- حمى.
- بقع حامية محددة بوضوح مع أو بدون بنور تتطور بعد عدة ساعات من تناول ليفوفلوكساسين وعندما تشفى أثر ضحبي على الجلد؛ عادة ما يتكرر في منطقة سليمة من الجلد أو في غشاء مخاطي بعد التناول التالي للليفوفلوكساسين.
- ضعف الذاكرة.

- أعراض غير محددة المعدل (لا يمكن تقدير معدل تكرارها من البيانات المتاحة)**
- انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء (أنيميا). قد يسبب ذلك بهتان الجلد أو اصفراره نتيجة تلف خلايا الدم الحمراء؛ مما يؤدي إلى انخفاض عدد جميع أنواع خلايا الدم (قلة الكريات الشاملة).
- يتوقف نشاط العظم عن إنتاج خلايا الدم الجديدة، مما قد يسبب التعب وانخفاض القدرة على مكافحة العدوى ونزيف غير متحكم به (فشل نخاع العظم).
- حمى والتهاب في الحلق والطفح وشعور عام بالإعياء، لا يزول. قد يكون ذلك نتيجة لانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء (نُدرة لمحيات).
- توقف الدورة الدموية (صدمة شبيهة بصدمة الحساسية).
- زيادة في مستويات السكر في الدم أو انخفاض في مستويات السكر في الدم مما يؤدي إلى حدوث غيبوبة (غيبوبة نقص السكر). وهو أمر مهم بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري.
- تغير أو فقدان حاسة الشم أو التذوق.
- الشعور بالآثرة الشديدة أو التشنوة أو الانفعال أو الحماس (الهوس).
- مشاكل في الحركة والسير (خلل الحركة).
- فقدان الوعي المفاجئ (الإغماء).
- فقدان مؤقت للرؤية والتهاب العين.
- اعتلال أو فقدان السمع.
- زيادة غير طبيعية في سرعة ضربات القلب وعدم انتظام ضربات القلب المهددة للحياة ويشمل توقف عضلة القلب وتغير معدل ضربات القلب (المعروف "بطول فترة QT في رسم القلب").
- صعوبة في التنفس أو صغیر (تشنّج قضي).
- تفاعلات حساسية في الرئة.
- التهاب البنكرياس.
- التهاب الكبد.
- زيادة حساسية الجلد عند التعرض للشمس وللأشعة فوق البنفسجية (الحساسية الضوئية)
- وتطور مناطق داكنة في الجلد (فرط التصبغ).
- التهاب الأوعية التي تحمل الدم إلى جميع أجزاء الجسم نتيجة لتفاعل حساسية (التهاب وعائي).
- التهاب الأنسجة داخل الفم (التهاب الفم).
- تمزق العضلات وتلفها.
- احمرار المفاصل وتورمها (التهاب المفاصل).
- الشعور بالألم، ويشمل آلماً في الظهر والصدر والأطراف.
- رتجات لا إرادية مفاجئة، أو تشنجات في العضلات أو انقباضات عضلية (وتعاض عضلي).
- نوبات بوفيري في الأشخاص المصابين بمرض بوفيري (مرض شديد التردد متعلق بعملية الأيض).
- صداع دائم يكون أو لا يكون مصحوباً برؤية ضبابية.

- الإبلاغ عن ظهور آثار جانبية**
- إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية فاستشر الطبيب أو الصيدلي. ويشمل هذا أي أعراض جانبية محتملة غير واردة في هذه النشرة.
- يمكنكم المساهمة في تقديم المزيد من المعلومات المتعلقة بسلامة هذا الدواء وذلك بالإبلاغ عن ظهور أي أعراض جانبية له.

٥- حفظ الدواء يُحفظ بعيداً عن مرأى و متناول الأطفال. إذا نُتسَعت هذا الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية الموضح على العبوة، يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من فترة صلاحية الدواء. يُحفظ الدواء في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ م° يُحفظ الشرط في العبوة الكرتون الخارجية لحمايته من الضوء. لا ينبغي التخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن طريقة التخلص من الأدوية التي لم تعد تستعملها. تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

- ٦- محتويات العبوة ومعلومات أخرى**
- محتويات الدواء**
- المادة الفعالة هي ليفوفلوكساسين.
- يحتوي كل قرص من أقراص زيكوين ٥٠٠ ملجم على ٥١٣ ملجم من ليفوفلوكساسين هيميهيدرات بما يعادل ٥٠٠ ملجم من ليفوفلوكساسين.
- أما المكونات الأخرى فهي:

- محتوى القرص من الداخل: هيدروكسي بروبيل ميثيل السيلولوز، وكروسبوفيدون، والسيليلوز الدقيق البلورات، والسيليكات الغروانية اللا مائية، نشاء ذرة ما قبل التهلُم وفومرات ستيريل الصوديوم.
- مكونات الغلاف: غلاف أوبادري ٧٠000-١-٢ و أكسيد الحديد الأحمر (E-172).

- الشكل الصيدلي لدواء زيكوين ومحتويات العبوة**
- يتوفر زيكوين ٥٠٠ ملجم في شكل أقراص مغلفة مسطّيلة محدبة الوجهين باللون الوردي، ومحززة من المنتصف ومحفور عليها "L" من جانب واحد. يمكن تقسيم القرص إلى جزئين متساويين.
- لا تتوقف عن تلقاء نفسك خلال فترة العلاج المحددة في الوصفة الطبية.
- لا تكرر نفس الوصفة دون استشارة الطبيب.
- تحفظ كافة الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

الشركة المصنعة المالكة لحق التسويق محتريرات سينفا، ش.م. شارع أولاز شيمي، ١٠ منطقة بوليغينو الصناعية ٣٦٦٢٠ أورانج (نافارا) - إسبانيا.
أجريت آخر مراجعة لهذه النشرة في أبريل ٢٠٢٥.
هذا دواء - الدواء هو منتج له تأثير على صحتك وتناوله بشكل مغاير لتعليمات قد يعرضك للخطر. - اتبع وصفة الطبيب بدقة، وكذلك لإرشادات الاستعمال وتعليمات الصيدلي. - إن الطبيب والصيدلي خبيران في الأدوية وفوائدها ومخاطرها. - لا تتوقف عن تلقاء نفسك خلال فترة العلاج المحددة في الوصفة الطبية. - لا تكرر نفس الوصفة دون استشارة الطبيب. - تحفظ كافة الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.
مجلس وزراء الصحة العرب اتحاد الصيدالة العرب

