





النشرة الداخلية: معلوماتٌ للمريض

# زيكوين ٥٠٠ ملجم أقراص مغلفة

ليفوفلوكساسين

اقرأ هذه النشرة الدوائية بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء؛ لأنها تحتوي على معلومات تهمك.

- استفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى فاسأل الطبيب أو الصيدلي.
- وُصف هذا الدواء من أجلك فقط، فلا تعطه لغيرك؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بهم، حتى وإن كانت أعراضهم المرضية مشابهة لما تشعر به.
- إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية فاستشر الطبيب أو الصيدلي ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. انظر القسم ٤.

محتويات هذه النشرة

- ١- ما هو زيكوين وما هي دواعي استعماله
- ٢- ما يجب معرفته قبل تناول دواء زيكوين
- ٣- الجرعة وطريقة استخدام زيكوين
- ٤- الآثار الجانبية المحتملة
- ٥- كيفية تخزين زيكوين
- ٦- محتويات العلبة ومعلومات أخرى

١- ما هو زيكوين وما هي دواعي استعماله

اسم الدواء هو زيكوين أقراص. تحتوي أقراص زيكوين على المادة الفعالة ليفوفلوكساسين. ينتمي هذا الدواء إلى مجموعة من أدوية المضادات الحيوية التي تعرف باسم الكينولون. ويؤدي مفعوله من خلال قتل البكتيريا المسببة للعدوى داخل جسمك.

تستخدم المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية. وهي ليست فعالة في علاج الالتهابات الفيروسية، مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد. يرجى اتباع تعليمات الطبيب بعناية فيما يتعلق بالجرعة، ومواعيد تناولها ومدة العلاج. لا تحتفظ بهذا الدواء أو تستخدمه لعلاج الحالات الأخرى. إذا كان لديك أي نوع من المضادات الحيوية المتبقية في نهاية دورة العلاج الخاصة بك، فارجى إعادتها إلى الصيدلي الذي سيخلص منها بشكل صحيح. لا تتخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية.

يستخدم زيكوين في علاج عدوى:

- الجيوب الأنفية.
- الرتتين، في الأشخاص الذين يعانون مشكلات طويلة الأمد في التنفس أو من التهاب رئوي.
- الجهاز البولي، ويشمل الكلتيين أو المثانة البولية.
- غدة البروستاتا، عندما تكون العدوى مستمرة وداعمة.
- الجلد وما تحت الجلد، بما في ذلك العضلات. وتُعرف أحياناً باسم "الأنسجة الرخوة".

في بعض الحالات الخاصة، قد تُستخدم أقراص زيكوين لتقليل احتمالية الإصابة بعرض رئوي يُعرف باسم الجمرة أو لتقليل لإدياد سوء المرض بعد تعرضك للبكتيريا المسببة له.

٢- ما يجب معرفته قبل تناول دواء زيكوين

لا تتناول هذا الدواء و استشر طبيبك إذا كنت تعاني من الحالات التالية:

- إذا كنت لديك حساسية لمادة ليفوفلوكساسين أو لأي من المضادات الحيوية التي تنتمي إلى مجموعة الكينولون مثل موكسيفلوكساسين أو سيروفلوكساسين أو أوفلوكساسين أو لأي من مكونات الدواء الأخرى (انظر القسم ٦).
- علامات حدوث تفاعلات الحساسية: طفح جلدي أو مشاكل في التنفس أو البلع أو تورم الشفاه أو الوجه أو الحلق أو اللسان.
- إذا كنت تعاني من عانيت مسبقاً من مرض الصرع.
- إذا أصبت مسبقاً بمشكلات في الأوتار (مثل التهاب الأوتار) نتيجة للعلاج بمضاد حيوي ينتمي إلى مجموعة الكينولون. الوتر هو الجبل الذي يربط العضلات بالهيكل العظمي.
- إذا كنت طفلاً في مرحلة النمو أو مراهقاً.
- إذا كنت حاملاً أو على وشك أن تكوني حاملاً أو تعتقدين أنك قد تصبحين حاملاً.
- إذا كنتِ في فترة الإرضاع.

لا تتناول هذا الدواء إذا انطبق عليّ أي من هذه الحالات. إذا لم تكن متأكدًا، استشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول زيكوين.

الاحتياطات والتحذيرات

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول الدواء في الحالات التالية:

- إذا كنت تبلغ من العمر ٦٠ عاماً أو أكثر.
- إذا كنت تستخدم حالياً الكورتيكوستيرويدات والتي تُعرف أحياناً بالستيرويدات (انظر "التفاعلات مع الأدوية الأخرى").
- إذا قمت بعملية زراعة أعضاء.
- إذا أصبت من قبل بنشجن (توبة صرع)
- إذا أصبت من قبل ببلتف في خلايا المخ نتيجة الإصابة بسكتة دماغية أو أي إصابة أخرى في المخ.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.
- إذا كنت مصاباً بمرض يُعرف باسم نقص نازعة هيدروجين الجلوكوز-6-فوسفات. فإنك تكون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل خطيرة في الدم عند تناول هذا الدواء.
- إذا كنت قد أصبت من قبل بمشكلات صعية عقلية.
- إذا كنت قد أصبت من قبل بمشاكل في القلب؛ يجب توخي الحذر عند استخدام هذا النوع من الأدوية، إذا كنت مولوداً أو مصاباً بتاريخ عائلي من الإصابة بطول فترة الفاصل الزمني (QT) (التي تظهر في رسم القلب، لتسجيل معدل ضربات القلب)، أو عدم توازن نسبة الألامح في الدم (وخاصة انخفاض مستوى البوتاسيوم أو الماغنيسيوم في الدم)، أو انخفاض معدل ضربات القلب (إشارة إليه بطء ضربات القلب) أو ضعف في عضلة القلب (قصور في القلب)، أو تاريخ من الإصابة بأزمة قلبية (ذبححة صدرية)، أو كنت أنثى أو كنت كبيراً في السن أو تتناول أدوية أخرى ينتج عنها تغيرات غير طبيعية في رسم القلب (انظر قسم "التفاعلات مع الأدوية الأخرى").
- إذا كنت مصاباً بداء السكري.
- إذا كنت قد أصبت من قبل بمشاكل في الكبد.
- إذا كنت مصاباً بوهن عضلي وبيل (مرض نادر يصيب الجهاز العصبي).
- إذا كنت تعاني من اضطرابات بالأعصاب الطرفية.
- إذا تم تشخيص حالتك بأن لديك تضخم أو انتفاخ في الأوعية الدموية الكبيرة (تعدد الشريان الأورطي أو تمدد الأوعية الطرفية الكبيرة).
- إذا عانيت سابقاً من ترقق في جدار الشريان الأورطي.
- إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بتمدد الشريان الأورطي أو ترقق جدار الشريان الأورطي أو عوامل الخطر الأخرى أو قابلية للإصابة بهم (كاضطرابات الأنسجة الضامة مثل متلازمة مرفان أو متلازمة أوعية إلهيز-دانلوس، أو كاضطرابات الأوعية الدموية مثل التهاب الشرايين تاكياسو، التهاب الشريان ذو الخلايا العلقاق، مرض بهسيت، ارتفاع ضغط الدم، أو الإصابة بتصلب الشرايين).
- إذا كنت قد أصبت بطفح جلدي شديد أو تقشر في الجلد أو ظهور بثور وأ/و تقرحات في الفم بعد تناول ليفوفلوكساسين.

تفاعلات جلدية شديدة تم الإبلاغ عن حدوث تفاعلات جلدية شديدة بما في ذلك متلازمة ستيفنز جونسون، و انحلال البشرة السُمي (NET)، و متلازمة فرط الحساسية المعروف ب (DRESS)؛ عند استخدام ليفوفلوكساسين.

- متلازمة ستيفنز جونسون و انحلال البشرة السُمي يمكن أن تظهر الأعراض في البداية على الجلد كبقع حمراء تشبه الهدف أو بقع دائرية وغالبًا يصاحبها ظهور بثور في المنتصف. يمكن أن تظهر القرحة أيضًا في الفم والحلق والأذن والأعضاء التناسلية والعينين (عيون منتفخة و حمراء). غالبًا ما يسبق هذا الطفح الجلدي الشديد حمى و / أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا. يمكن أن يتطور الطفح الجلدي إلى تقشر الجلد بشكل عام ومضاعفات مهددة للحياة.
- متلازمة فرط الحساسية (DRESS) تظهر في البداية أعراض تشبه الإنفلونزا وطفح جلدي على الوجه، يتبعه طفح جلدي أكثر شمولاً مع ارتفاع في درجة الحرارة، و ارتفاع مستوى إنزيمات الكبد في اختبارات الدم وزيادة في نوع معين من خلايا الدم البيضاء (فرط الحمضات) وتضخم العقد الليمفاوية.

إذا أصبت بطفح جلدي حاد أو أي من هذه الأعراض الجلدية ، فنوقف عن تناول ليفوفلوكساسين واتصل بطبيبك أو اطلب العناية الطبية على الفور.

يجب عدم تناول الأدوية المضادة للبكتيريا التي تحتوي على الفلوروكينولون أو الكينولون، بما في ذلك زيكوين، إذا كنت قد عانيت سابقًا من أي أعراض جانبية خطيرة عند تناول الكينولون أو الفلوروكينولون. في هذه الحالة، يجب عليك إبلاغ طبيبك في أقرب وقت ممكن.

استشر طبيبك أو المجرضة أو الصيدلي أثناء العلاج بفلوروكينولون إذا:

- إذا شعرت بألم حاد مفاجئ في البطن أو الصدر أو الظهر، اذهب فوراً إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى.

- Stress (anxiety)، confusion، nervousness، drowsiness، tremors، dizziness (vertigo)
- Breathing difficulties (dyspnoea)
- Changes in the taste of things، loss of appetite، stomach disorders or indigestion (dyspepsia)، pain in the stomach area، feeling of bloating (flatulence) or constipation
- Itching and skin rash، intense itching or hives (urticaria)، excessive sweating (hyperhidrosis)
- Joint or muscle pain
- Abnormal levels in your blood tests due to liver problems (increased bilirubin) or kidney (increased creatinine)
- Generalised weakness

**Rare** (may affect up to 1 in 1,000 people)

- Bruising and bleeding easily due to the decrease in the number of blood platelets (thrombocytopenia)
- Decrease in the number of white blood cells in your blood (neutropenia)
- Exaggerated immune response (hypersensitivity)
- Tingling in your hands and feet (paraesthesia)
- Ear (tinnitus) or vision (blurred vision) disorders
- Abnormally fast heart beat (tachycardia) or decreased blood pressure (hypotension)
- Muscle weakness, This is important in people with myasthenia gravis (rare nervous system disease)
- Kidney function changes and occasionally kidney failure, which can be the result of an allergic reaction in the kidneys called interstitial nephritis
- Fever
- Clearly defined erythematous patches with or without blisters that develop several hours after administration of levofloxacin and heal with residual post-inflammatory hyperpigmentation; it generally recurs in the sane area of skin or mucous membrane after subsequent exposure to levofloxacin.
- Memory impairment

**Frequency not known** (cannot be estimated from the available data).

- Decrease in red blood cells in the blood (anaemia): this can make your skin pale or yellowish due to red blood cell damage; decrease in the number of all types of blood cells (pancytopenia)
- Fever، sore throat and persistent general malaise. This may be due to a decrease in the number of white blood cells (agranulocytosis)
- Circulatory collapse (anaphylactic-type shock)
- Increased sugar levels in blood (hyperglycaemia). This is important in people with diabetes
- Changes to your sense of smell، loss of smell or taste (parosmia، anosmia، ageusia)
- Movement and gait disorders (dyskinesia، extrapyramidal disorders)
- Temporary loss of consciousness or posture (syncope)
- Temporary loss of vision، inflammation of the eyes
- Hearing problems or loss
- Abnormally fast heartbeat، life-threatening irregular heartbeat، including the heart stopping، altered heart rhythm (so-called "prolongation of the QT interval"، observed in an ECG، graphical representation of the electrical activity of the heart)
- Shortness of breath or wheezing (bronchospasm)
- Lung allergic reactions
- Inflammation of the pancreas (pancreatitis)
- Inflammation of the liver (hepatitis)
- Increased sensitivity of the skin to sunlight and ultraviolet light (photosensitivity)

- Inflammation of the vessels that carry blood throughout the body due to an allergic reaction (vasculitis)
- الكورتيكوستيرويدات، وأحياناً تُعرف باسم الستيرويدات - تُستخدم لعلاج الالتهاب. قد تكون أكثر احتمالاً للإصابة بالتهاب وأو ترقق في الأوتار.
- وارفارين - يُستخدم لمنع تكون جلطات الدم وتحسين السيولة. من المحتمل أن تصاب بنزيف. قد يحتاج طبيبك إلى إجراء اختبارات دم بانتظام لتأكد من مستوى سيولة الدم.
- ثيوفيلين - يستعمل لعلاج الربو. قد تكون أكثر عرضة للإصابة بتشنجات (نوبات صرع) عند تناوله مع زيكوين.
- مضادات التهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) - تُستخدم لعلاج الألم والالتهاب مثل الأسبرين وأيبوبروفين وفينوبروفين، وكيتوبروفين وإندوميثاسين. قد تكون أكثر عرضة للإصابة بنشجن (توبة صرع) عند تناوله مع زيكوين.
- سيكلوسبورين - يُستخدم بعد جراحات زراعة الأعضاء. قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالآثار الجانبية المحتملة لسيكلوسبورين.
- الأدوية المعروفة بتأثيرها في معدل ضربات القلب. وتشمل الأدوية المستخدمة لعلاج عدم انتظام ضربات القلب (مضادات اضطراب نظم ضربات القلب مثل كينيدين وهيدروكسيديد سيكلوسبوريميد وسوتاتول ودوفيتيليد وإيبوتيليد وأميودارون)، ولعلاج الانكئاب (مضادات الانكئاب الثلاثية الحلقات مثل أميتريبتيلين وإيميرامين)، ولعلاج الاضطرابات النفسية (مضادات الأذهان) ولعلاج العدوى البكتيرية (المضادات الحيوية الماركوлиндية مثل إريثروميسين وأزثروميسين وكلاريثروميسين).
- برونيبيديس - يُستخدم لعلاج النقرس. قد يرغب طبيبك في إعطائك جرعة أقل إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.
- سيميتيدين - يُستخدم لعلاج القرح وحرقة المعدة. قد يرغب طبيبك في إعطائك جرعة أقل إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.

أخبر طبيبك إذا انطقت عليك أي من الحالات السابقة.

**Reporting of side effects**

If you get any side effects talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

### 5. How to store Ziquin tablets

Keep out of the reach and sight of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is shown on the packaging. The expiry date refers to the last day of the month. Do not store at a temperature above 30°C. Keep the blister in the outer carton in order to protect from light. Medicines should not be disposed of via wastewater of household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

### 6. Contents of the pack and other information

**What Ziquin contains**

The active ingredient is levofloxacin. Each tablet of Ziquin 500 mg tablets contains 512.5 mg of levofloxacin hemihydrate equivalent to 500 mg of levofloxacin.

The other ingredients are:

- Tablet core: hydroxypropyl methylcellulose، crospovidone، microcrystalline cellulose، colloidal anhydrous silica، pregelatinized corn starch and sodium stearyl fumarate.
- Film coating: Opadry Y-1-7000 and red iron oxide (E-172).

**What Ziquin looks like and contents of the pack**

Ziquin 500 mg film-coated tablets are biconvex pink color film coated oblong tablets، scored and with "L" engraved on one side. The tablet can be divided into equal halves. Each pack contains 5 tablets (5's blister x 1)، 7 tablets (7's blister x 1) or 10 tablets (10's blister x 1).

**Marketing Authorisation Holder and Manufacturer**
Laboratorios Cinfa, S.A.
Olaz-Chipi, 10. Polígono Industrial Areta
31620 Huarte (Navarra) - Spain

**This is a Medicament**

- Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription، the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines، their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

**Council of Arab Health Ministers**  
**Union of Arab Pharmacists**

- Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription، the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines، their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

**Council of Arab Health Ministers**  
**Union of Arab Pharmacists**

**This is a Medicament**

- Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription، the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines، their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

**Council of Arab Health Ministers**  
**Union of Arab Pharmacists**

**This is a Medicament**

- Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription، the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines، their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

**Council of Arab Health Ministers**  
**Union of Arab Pharmacists**

**This is a Medicament**

**What dose should you take**

- Your doctor will decide what amount of Ziquin tablets you should take.
- The dose will depend on the type of infection you have and where the infection is located in your body.
- The duration of treatment depends on the severity of your infection.
- If you think that the effect of the medicine is too weak or strong، do not change the dose yourself، ask your doctor.

**Adults and elderly patients**

**Infection in the paranasal sinuses**

- one 500 mg Ziquin tablet once a day

**Lung infection in people with long-term respiratory problems**

- one 500 mg Ziquin tablet once a day

**Pneumonia**

- one 500 mg Ziquin tablet، once or twice a day

**Urinary tract infection، including kidneys or bladder**

- half or one 500 mg Ziquin tablet once a day

**Prostate infection**

- one 500 mg Ziquin tablet once a day

**Infection in the skin and under the skin، including muscles**

- one 500 mg Ziquin tablet، once or twice a day

**Adults and elderly patients with kidney problems**

Your doctor may give you a lower dose.

**Use in children and adolescents**

This medicine should not be administered to children or adolescents.

**Protect your skin from sunlight**

Do not expose your skin to direct sunlight (even when cloudy) while taking this medicine and for two days after you stop taking it، because your skin will become much more sensitive to the sun and may burn، sting or even be covered with blisters if you do not take the following precautions:

- Make sure you use sunscreens with a high protection factor
- Always wear a hat and clothing that covers your arms and legs
- Avoid ultraviolet (UVA) lamps

**If you take more Ziquin tablets than you should**

If you accidentally take more tablets than you should، tell your doctor or get medical help immediately. Bring the medicine with you so your doctor knows what you have taken. The effects that may occur are: epileptic fits (seizures)، confusion، dizziness، loss of consciousness، tremors، heart disorders that can cause irregular heart beats as well as sickness (nausea) or heartburn.

**If you forget to take Ziquin tablets**

If you forget to take a dose، take it right away، unless it is almost time for your next dose. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

**If you stop taking Ziquin tablets**

Do not stop taking Ziquin، even if you feel better. It is important that you finish the treatment your doctor has prescribed for you. If you stop taking the tablets too soon، the infection may come back، your condition may worsen or the bacteria may become resistant to the medicine.

If you have any further questions on the use of this medicine، ask your doctor or pharmacist.

#### 4. Possible side effects

Like all medicines، this medicine can cause side effects، although not everybody gets them. Effects are normally mild to moderate and usually disappear in a short time.

**Stop treatment with Ziquin and contact a doctor or go to a hospital quickly if you notice the following adverse effects:**

**Very rare** (may affect up to 1 in 10,000 people)

- If you have an allergic reaction. The signs may include: skin rash، difficulty breathing or swallowing، swollen lips، face، throat or tongue

**Stop treatment with Ziquin and contact a doctor immediately if you notice the following serious adverse effects، as you might need urgent medical treatment:**

**Rare** (may affect up to 1 in 1,000 people)

- Watery diarrhoea that may contain blood، possibly with stomach cramps and fever. These could be signs of a serious intestinal problem
- Pain and inflammation in your tendons or ligaments، which could lead to a rupture. the Achilles tendon is most commonly affected
- Epileptic fits (seizures)
- Seeing or hearing things that are not real (hallucinations، paranoia)
- Depression، mental disorders، feeling restless (agitation)، abnormal dreams or nightmares
- Generalised rash، high temperature، elevated liver enzymes، abnormal blood count (eosinophilia)، enlarged lymph nodes and involvement of other organs in the body (drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms known as DRESS or drug hypersensitivity syndrome). See section 2.
- Syndrome associated with water retention and low levels of sodium (SIADH).
- Decreased blood sugar levels (hypoglycaemia) or decreased blood sugar levels which can lead to coma (hypoglycaemic coma). This is important for diabetic patients

**Very rare** (may affect up to 1 in 10,000 people)

- Burning، tingling، pain or numbness. These may be signs of what is called "neuropathy"

**Frequency not known** (cannot be estimated from the available data).

- Severe skin rashes، including Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. These can appear on the trunk as red target-like or circular patches with blisters in the middle، flaking skin and ulcers in the mouth، throat، nose، genitals and eyes، and they may be preceded by fever and flu-like symptoms. See section 2.
- Loss of appetite، yellowing of the skin and eyes، dark urine، stinging or stomach painful on palpation (abdomen). These may be signs of liver problems which may include fulminant liver failure.
- Changes of opinion and thoughts (psychotic reactions) with risk of suicidal thoughts or actions.

Immediately consult an eye specialist if your vision deteriorates or you have any other problems in your eyes while taking Ziquin.

The administration of antibiotics containing quinolones and fluoroquinolones has been linked to very rare cases of long lasting (up to months or years) or permanent adverse drug reactions، such as inflammation of tendons، tendon rupture، joint pain، pain in the limbs، difficulty walking، abnormal sensations such as pins and needles، tingling، tickling، burning، numbness or pain (neuropathy)، depression، fatigue، sleep disorders، memory impairment، as well as impairment of hearing، vision، taste and smell، in some cases regardless of the presence of pre-existing risk factors.

Aortic wall enlargement and weakening or tearing (aneurysms and dissections)، which could lead to rupture and become fatal، and heart valve failure have been reported in patients who have received fluoroquinolones. See also section 2.

**Tell your doctor if any of the following adverse effects worsen or last for more than a few days.**

**Common** (may affect up to 1 in 10 people).

- Sleep problems
- Headache، dizziness
- Malaise (nausea، vomiting) and diarrhoea
- Increase in the level of some liver enzyms in your blood

**Uncommon** (may affect up to 1 in 100 people)

- Changes in the number of other bacteria or fungi، infection by a fungus called Candida، which may need treatment
- Changes in the number of white blood cells in your blood test results (leukopenia، eosinophilia)

