

PROSPECTO

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

En este prospecto:

1. Qué es **ambroxol cinfa® 15 mg/5 ml jarabe** y para qué se utiliza.
2. Antes de tomar **ambroxol cinfa® 15 mg/5 ml jarabe**.
3. Cómo tomar **ambroxol cinfa® 15 mg/5 ml jarabe**.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de **ambroxol cinfa® 15 mg/5 ml jarabe**.

ambroxol cinfa® 15 mg/5 ml jarabe EFG

El principio activo es clorhidrato de ambroxol.

Cada 5 ml de jarabe contienen 15 mg de ambroxol.

Los demás componentes son: aroma de frambuesa, ácido cítrico monohidrato, glicerol, hidroxietilcelulosa, ácido benzóico, propilenglicol, sorbitol al 70%, sacarina sódica y agua purificada.

Titular y fabricante

LABORATORIOS CINFA, S.A.

C/ Olaz-Chipi, 10. Polígono Industrial Areta.

31620 Huarte-Pamplona (Navarra) España.

1. Qué es ambroxol cinfa® 15 mg/5 ml jarabe y para qué se utiliza

ambroxol cinfa® 15 mg/5 ml jarabe se presenta en envases que contienen 200 ml.

Ambroxol pertenece al grupo de medicamentos denominados mucolíticos. Actúa disminuyendo la viscosidad de las secreciones bronquiales y facilitando la expectoración.

El ambroxol está indicado en las afecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias en las que sea necesario favorecer la eliminación de secreciones.

2. Antes de tomar ambroxol cinfa® 15 mg/5 ml jarabe

No tome ambroxol cinfa® 15 mg/5 ml jarabe:

- Si ha experimentado fenómenos de alergia a ambroxol o a cualquiera de sus excipientes.

Tenga especial cuidado con ambroxol cinfa® 15 mg/5 ml jarabe:

Este medicamento contiene 2,25 g de sorbitol como excipiente por 5 ml. Puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.

Este medicamento por contener glicerol como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

Embarazo:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. El tratamiento con ambroxol no ha demostrado ser nocivo durante el embarazo. No obstante, su médico valorará el beneficio/riesgo de su administración.

Lactancia:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. El tratamiento con ambroxol no ha demostrado ser nocivo para el niño. No obstante, su médico valorará el beneficio/riesgo de su administración.

Toma de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

3. Cómo tomar ambroxol cinfa® 15 mg/5 ml jarabe

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras distintas. Recuerde tomar su medicamento.

Si estima que la acción de este medicamento es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Su médico le indicará la dosis apropiada y la duración del tratamiento.

La dosis habitual es:

Adultos: 1 medida de 10 ml, 3 veces al día.

Si Usted ha tomado más **ambroxol cinfa® 15 mg/5 ml jarabe**, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico. Lleve este prospecto con usted. No se han descrito hasta la fecha síntomas de sobredosificación. El tratamiento en este caso será sintomático.

En caso de sobredosis o administración accidental, consultar con el Servicio de Información Toxicológica 91 562 04 20.

4. Posibles efectos adversos

Como todos los medicamentos, ambroxol puede tener efectos adversos.

En algunos casos se han producido trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, acidez y molestias gastrointestinales. Raras veces se han producido reacciones alérgicas.

Si se observa alguna de estas reacciones o cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.

5. Conservación de ambroxol cinfa® 15 mg/5 ml jarabe

No conservar a temperatura superior a 30°C.

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS
--

Este prospecto ha sido aprobado en Enero de 2003.