

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.**

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

**En este prospecto:**

1. Qué es **loratadina cinfa<sup>®</sup> 10 mg comprimidos** y para qué se utiliza.
2. Antes de tomar **loratadina cinfa<sup>®</sup> 10 mg comprimidos**.
3. Cómo tomar **loratadina cinfa<sup>®</sup> 10 mg comprimidos**.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de **loratadina cinfa<sup>®</sup> 10 mg comprimidos**.

**loratadina cinfa<sup>®</sup> 10 mg comprimidos EFG**

El principio activo es loratadina Cada comprimido contiene 10 mg de loratadina.  
Los demás excipientes son: lactosa, almidón de maíz, povidona y estearato de magnesio.

**Titular y Responsable de la fabricación:**

Laboratorios Cinfa, S.A.  
C/ Olaz-Chipi, 10 - Polígono Industrial Areta.  
31620 Huarte - Pamplona (Navarra)-España

**1. Qué es loratadina cinfa<sup>®</sup> 10 mg comprimidos y para qué se utiliza**

**loratadina cinfa<sup>®</sup> 10 mg** se presenta en forma de comprimidos. Cada envase contiene 20 comprimidos en blister.

**loratadina cinfa<sup>®</sup> 10 mg** pertenece a una clase de medicamentos conocidos como antihistamínicos.

**loratadina cinfa<sup>®</sup> 10 mg** alivia los síntomas asociados a la rinitis alérgica (tales como estornudos, goteo o picor nasal y escozor o picor en los ojos).

**loratadina cinfa<sup>®</sup> 10 mg** también se puede utilizar para ayudar a aliviar los síntomas de la urticaria (tales como picor, enrojecimiento y el número y el tamaño de las ronchas cutáneas).

**2. Antes de tomar loratadina cinfa<sup>®</sup> 10 mg comprimidos.**

**No tome loratadina cinfa<sup>®</sup> 10 mg:**

- Si es alérgico a loratadina o a cualquiera de los componentes de **loratadina cinfa<sup>®</sup> 10 mg**.

**Tenga especial cuidado con loratadina cinfa<sup>®</sup> 10 mg si:**

- Presenta enfermedad hepática grave (Ver apartado 3. Como tomar **loratadina cinfa<sup>®</sup> 10 mg comprimidos**).
- Se le va a efectuar cualquier tipo de prueba cutánea para alergia. No tome **loratadina cinfa<sup>®</sup> 10 mg** durante los 2 días previos a la realización de dichas pruebas, porque este medicamento puede alterar los resultados de las mismas.

### **Toma de loratadina cinsa con los alimentos y bebidas**

**loratadina cinsa® 10 mg** puede tomarse con o sin alimentos.

### **Embarazo y lactancia**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento.

No se recomienda que tome loratadina cinsa® 10 mg si está embarazada o en periodo de lactancia.

### **Conducción y uso de máquinas**

A dosis normales, **loratadina cinsa® 10 mg** no afecta a la capacidad de conducir o utilizar máquinas. Si usted nota síntomas de somnolencia, no conduzca ni use máquinas, no obstante, procure no realizar tareas que puedan requerir una atención especial hasta que sepa cómo tolera el medicamento.

### **Información importante sobre algunos de los componentes de loratadina cinsa® comprimidos:**

**loratadina cinsa® 10 mg** contiene lactosa; por lo tanto si su médico le ha dicho que presenta intolerancia a algunos azúcares, coménteselo a su médico antes de tomar este medicamento.

### **Uso de otros medicamentos**

No se conocen interacciones de **loratadina cinsa® 10 mg** con otros medicamentos. No obstante, informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

## **3. Cómo tomar loratadina cinsa® 10 mg comprimidos**

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con **loratadina cinsa® 10 mg**. No suspenda el tratamiento antes.

#### ***Adultos y niños mayores de 6 años de edad:***

Tome un comprimido (10 mg) una vez al día.

#### ***Niños de 2 a 5 años de edad***

Tomar 5 mg una vez al día (medio comprimido).

#### ***Pacientes con problemas hepáticos graves con un peso superior a 30 kg:***

Tome un comprimido (10 mg), una vez al día y en días alternos.

#### ***Pacientes con problemas renales:***

Tome un comprimido (10 mg), una vez al día y en días alternos.

**loratadina cinsa® 10 mg** no es adecuado para:

- la administración de dosis inferiores a 10 mg.
- la administración en pacientes con peso inferior a 30 kg.
- aquellos pacientes que tengan problemas al tragar.

No se recomienda **loratadina cinsa® 10 mg** en niños menores de 2 años de edad.

### **Si usted toma más loratadina cinsa® 10 mg del que debiera:**

Si usted toma más **loratadina cinsa® 10 mg** del que debiera, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica; Teléfono 91562 04 20.

**Si olvidó tomar loratadina cifa® 10 mg:**

Si olvidó tomar su dosis a tiempo, tómela lo antes posible, y luego vuelva a su pauta de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

**4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, **loratadina cifa® 10 mg** puede tener efectos adversos.

Los efectos adversos comunicados más frecuentemente (menos de 1 por cada 10 pacientes pero más de 1 por cada 100 pacientes) incluyen somnolencia, dolor de cabeza, nerviosismo, cansancio aumento del apetito y dificultad para dormir.

Los efectos adversos comunicados muy raramente (menos de 1 por cada 10000 pacientes) han sido casos de reacción alérgica grave, mareo, latidos cardíacos irregulares o rápidos, náuseas (ganas de vomitar), sequedad de boca, estómago revuelto, problemas hepáticos, pérdida del cabello, erupción cutánea y cansancio.

Si observan estos efectos adversos u otros no descritos en este prospecto, comuníquese a su médico o farmacéutico.

**5. Conservación de loratadina cifa® 10 mg comprimidos.**

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS
--

No se precisan condiciones especiales de conservación.

**Caducidad**

No utilice **loratadina cifa® 10 mg comprimidos** después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**Este prospecto ha sido aprobado en septiembre de 2004**